




مكتب الاستشارات والتدريب
Consultation & Training Office



المفاهيم والتطبيقات الأساسية لمادة الرياضيات



مكتب الاستشارات والتدريب
كلية العلوم - جامعة الكويت

٢٠١٢ - ٢٠١١

تدريس اختبار القدرات وتمهيدي كيمياء 101-102-110 96618707

المقدمة

يسر مكتب الإستشارات والتدريب في كلية العلوم - جامعة الكويت، تقديم هذه
المذكرة التي تشتمل على بعض المفاهيم والتطبيقات الأساسية في الرياضيات لطلبة
الثانوية الراغبين في الالتحاق بالجامعة.

كما يتقدم المكتب بالشكر والتقدير لقسم الرياضيات بكلية العلوم، وبالأخص
الأستاذ الدكتور إسماعيل تقي والدكتور أحمد عبد اللطيف وذلك
لمساهمتهم في إعداد هذه المذكرة، راجياً من الله عز وجل النجاح والتوفيق لأبنائنا
الطلبة.

مدير مكتب الإستشارات والتدريب
كلية العلوم - جامعة الكويت

١٠١	 تمارين الاختبارات في جغرافية مصر الحديثة -
٨٦	 تمارين الاختبارات في جغرافية مصر الحديثة -
٤٦	 الجغرافية الطبيعية / الفصل الأول من مختلف المسائل -
٩١	 الجغرافية الطبيعية / الفصل الثاني من مختلف المسائل -
٨٩	 الجغرافية الطبيعية / الفصل الثالث من مختلف المسائل -
٤٦	 الجغرافية الطبيعية / الفصل الرابع من مختلف المسائل -
٨٣	 الجغرافية الطبيعية / الفصل الخامس من مختلف المسائل -
٤٥	 الجغرافية الطبيعية / الفصل السادس من مختلف المسائل -
٤٣	 الجغرافية الطبيعية / الفصل السابع من مختلف المسائل -
٤٥	 الجغرافية الطبيعية / الفصل الثامن من مختلف المسائل -
٣٥	 الجغرافية الطبيعية / الفصل التاسع من مختلف المسائل -
١٣	 الجغرافية الطبيعية / الفصل العاشر من مختلف المسائل -
٤٣	 الجغرافية الطبيعية / الفصل الحادي عشر من مختلف المسائل -
٨٨	 الجغرافية الطبيعية / الفصل الثاني عشر من مختلف المسائل -
٣١	 الجغرافية الطبيعية / الفصل الثالث عشر من مختلف المسائل -
١	 الجغرافية الطبيعية / الفصل الرابع عشر من مختلف المسائل -

مقدمة المحاضرة الأولى

الفصل الأول

الأعداد الحقيقية

(١ - ١) مقدمة عن الأعداد الحقيقية

إن معظم المفاهيم الأساسية في علم التفاضل والتكامل تعتمد على الأعداد

الحقيقية حيث يتم التعامل مع لوال ذات متغيرات حقيقية.

ولإعطاء فكرة عن الأعداد الحقيقية نورد فيما يلي بعض أنواعها:

١ - الأعداد الصحيحة

وهي عناصر المجموعة التالية والتي تسمى مجموعة الأعداد الصحيحة

$$\text{ص} = \{ \dots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots \}$$

وإذا اقتصرنا على الأعداد الصحيحة الموجبة فأننا نحصل على مجموعة

العد التالية :

$$\text{ط} = \{ 0, 1, 2, 3, 4, \dots \}$$

٢ - الأعداد النسبية

وهي الأعداد التي يمكن كتابتها على الصورة $\frac{ب}{ج}$

حيث ب، ج عدان صحيحان ، ج $\neq 0$

مثال

الأعداد التالية هي أعداد نسبية

$$\frac{١٢}{٥} = ٣, \frac{٣}{١} = ٣, \frac{٠}{٤} = ٠, \frac{٢}{٣} = ٠,٦٦٦, \frac{٥}{٢} = ٢,٥$$

٣- الأعداد غير النسبية

وهي الأعداد التي لا يمكن كتابتها على صورة عدد نسبي

مثال

الأعداد التالية هي أعداد غير نسبية


$$\pi , \sqrt{2} , \sqrt[3]{2} , \sqrt[3]{3}$$

٤- مجموعة الأعداد الحقيقية ح

هي المجموعة التي تتكون من جميع الأعداد النسبية وغير النسبية يمكن تمثيل الأعداد الحقيقية على خط مستقيم يسمى خط الأعداد الحقيقية بحيث يتم تمثيل كل عدد حقيقي بنقطة واحدة فقط على خط الأعداد وبالعكس فإن كل نقطة على خط الأعداد تقابل عددا حقيقيا وحيدا .

جميع الأعداد الحقيقية عدا الصفر إما أن تكون سالبة أو موجبة فالأعداد التي تقابل النقاط الواقعة على يمين الصفر تكون موجبة والأعداد التي تقابل النقاط الواقعة على يسار الصفر تكون سالبة. وإذا كان لدينا عدنان على خط الأعداد فإن العدد الواقع على اليسار يكون أصغر من العدد الواقع على اليمين

$$\text{فمثلا } 4- < 3- , \frac{17}{3} < 6$$



(٢ - ١) خواص الأعداد الحقيقية

لتكن a, b, c أعدادا حقيقية فإن

$$١- \quad a + b = b + a, \quad ab = ba$$

$$١١ = ٨ + ٣ = ٣ + ٨, \quad ٨٥ = (١٧)(٥) = (٥)(١٧)$$

$$٢- \quad (a + b) + c = c + (b + a), \quad a(bc) = (ab)c$$

$$٦٠ = (٤ \times ٣) \times ٥ = ٤ \times (٣ \times ٥), \quad ١٤ = (٢ + ٥) + ٧ = ٢ + (٥ + ٧)$$

$$٣- \quad a(b + c) = (b + c)a$$

$$٢٥٠ = ٦ \times ٢٥ + ٤ \times ٢٥ = (٦ + ٤) \times ٢٥$$

٤- إذا كان العددان a, b موجبين فإن العددين $a + b, ab$ موجبين أيضا

٥- إذا كان العددان a, b سالبين فإن العدد $a + b$ يكون سالبا والعدد ab يكون موجبا

٦- إذا كان العدد a موجبا والعدد b سالبا فإن العدد ab يكون سالبا

٧- إذا كان $ab = ٠$ فلما أن يكون $a = ٠$ أو $b = ٠$

فمثلا إذا كان $٣b = ٠$ فإن $b = ٠$

(١ - ٣) الكسور

ليكن أ ، ب عدنان حقيقيان بحيث $b \neq 0$.

نسمى العدد $\frac{a}{b}$ كسرا وفي هذه الحالة يسمى العدد أ بسطا ويسمى العدد ب مقاما

$$\frac{a}{b} = \frac{a}{b} \quad \text{إذا وفقط إذا كان} \quad ad = bc$$

$$\text{فمثلا} \quad \frac{14}{6} = \frac{7}{3} \quad \text{لان} \quad 14 \times 3 = 6 \times 7 = 42$$

$$\frac{a \times c}{b \times c} = \frac{a}{b} \quad \text{حيث} \quad c \neq 0$$

$$\text{فمثلا} \quad \frac{10}{15} = \frac{5 \times 2}{5 \times 3} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{7}{9} = \frac{2 \times 7}{2 \times 9} = \frac{14}{18}$$

العمليات على الكسور

العملية	مثال توضيحي
١ $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}$	$\frac{2}{3} + \frac{5}{4} = \frac{2 \times 4 + 3 \times 5}{3 \times 4} = \frac{23}{12}$
٢ $\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad - bc}{bd}$	$\frac{2}{3} - \frac{5}{4} = \frac{2 \times 4 - 3 \times 5}{3 \times 4} = \frac{7}{12}$
٣ $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$	$\frac{4}{7} \times \frac{3}{5} = \frac{4 \times 3}{7 \times 5} = \frac{12}{35}$
٤ $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{ad}{bc}$	$\frac{7}{5} \div \frac{2}{3} = \frac{7 \times 3}{5 \times 2} = \frac{21}{10}$

$$\frac{\frac{2}{5} + \frac{3}{4}}{\frac{3}{5} - \frac{2}{3}}$$

مثال اكتب الكسر التالي في أبسط صورة

$$\frac{\frac{8 + 10}{20}}{\frac{9 - 10}{10}} = \frac{\frac{2}{5} + \frac{3}{4}}{\frac{3}{5} - \frac{2}{3}}$$

حل

$$\frac{79}{4} = \frac{10 \times 23}{1 \times 20} = \frac{1}{10} \div \frac{23}{20} =$$

حل آخر نضرب كلا من البسط والمقام بالمضاعف المشترك الأصغر للمقامات ٣، ٤، ٥

والذي يساوي ٦٠

$$\frac{12 \times 2 + 10 \times 3}{12 \times 3 - 20 \times 2} = \frac{60 \times \left(\frac{2}{5} + \frac{3}{4} \right)}{60 \times \left(\frac{3}{5} - \frac{2}{3} \right)} = \frac{\frac{2}{5} + \frac{3}{4}}{\frac{3}{5} - \frac{2}{3}}$$

$$\frac{79}{4} = \frac{24 + 40}{36 - 40} =$$

(١ - ٤) الأسس الصحيحة

ليكن أ عددا حقيقيا وليكن ن عددا صحيحا موجبا فإن

$$\underbrace{1 \times \dots \times 1 \times 1}_n = 1$$

ن مرة

يسمى العدد أ الأساس ويسمى العدد ن الأس

أمثلة

$$243 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^5$$

$$\frac{8}{27} = \frac{2 \times 2 \times 2}{3 \times 3 \times 3} = \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \left(\frac{2}{3}\right)^3$$

$$125 = 5 \times 5 \times 5 = (5-)(5-)(5-) = (-5)^3$$

الأسس الصفري والأس السالب

ليكن أ عددا حقيقيا لا يساوى الصفر ، وليكن ن عددا صحيحا موجبا فإن

$$\frac{1}{a^n} = a^{-n} , \quad 1 = a^0$$

مثال

$$1 = \left(\frac{5}{9}\right)^0 , \quad 1 = (-243)^0$$

$$\frac{1}{81} = \frac{1}{3 \times 3 \times 3 \times 3} = \frac{1}{3^4} = 3^{-4}$$

قوانين الأسس الصحيحة

$$1 - a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$2 - \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

$$3 - \frac{a^m}{a^n} = \frac{1}{a^n} \cdot a^m = \left(\frac{1}{a}\right)^n \cdot a^m = \left(\frac{a}{1}\right)^n = a^n$$

$$4 - a^m \cdot a^n = a^{m+n} : \quad 24 = 12 = 2(12) : \quad 64 = 16 = 2^4$$

مثال اكتب الكسر التالي في أبسط صورة

$$\frac{(2-1 \text{ ب} 3-)}{(1-1 \text{ ب} 3-)} = \frac{2-1 \text{ ب} 3-}{1-1 \text{ ب} 3-}$$

$$\frac{2-1 \text{ ب} 3-}{1-1 \text{ ب} 3-} = \frac{2-1 \text{ ب} 3-}{1-1 \text{ ب} 3-}$$

$$\frac{2-1 \text{ ب} 3-}{1-1 \text{ ب} 3-} =$$

$$\frac{13-3}{1-1 \text{ ب} 3-} =$$

(١ - ٥) الأسس النسبية

نعرف $\frac{1}{n}$ كما يلي

$$\left. \begin{array}{l} \text{ب} \text{ إذا فقط إذا كان } \text{ب} = \text{ن} , \text{ ن عدد فردي} \\ \text{ب} \text{ إذا فقط إذا كان } \text{ب} = \text{ن} , \text{ ن عدد زوجي} \end{array} \right\} = \frac{1}{n}$$

كما نعرف $\frac{m}{n}$ كما يلي

$$\frac{m}{n} = \left(\frac{1}{n} \right)^m = \frac{m}{n}$$

يمكن تعميم قوانين الأسس الصحيحة لتشمل الأسس النسبية

فإذا كان أ ، ب عددين حقيقيين ، ك ، ل عددين نسبيين فإن

$$١- ا ك ا ل = ا ل + ك ل$$

$$٢- \frac{ا ك}{ا ل} = ا ك - ل$$

$$٣- ا (ب \times ك) = ا ك \times ب$$

$$٤- \frac{ا}{ب} = ك \left(\frac{ا}{ب} \right)$$

$$٥- ا (ك) = ل (ا ك)$$

$$٦- ا - ك = \frac{ا}{ك}$$

امثلة :

$$٩ = ٣٣ = ٣ \left(\frac{٣}{٣} ٣٣ \right) = \frac{٣}{٣} (٣٣)$$

$$\frac{١}{٨} = \frac{١}{٣(٣-)} = \frac{١}{٣ \left[\frac{١}{٥} (٣٣-) \right]} = \frac{١}{\frac{٣}{٥} (٣٣-)} = \frac{٣-}{٥} (٣٣-)$$

$$\frac{^{\wedge} \left(\frac{١}{٦} - ا \right)}{\frac{١}{٤} ا} = \frac{^{\wedge} \left(\frac{٣}{٣} - \frac{١}{٣} ا \right)}{\frac{١}{٤} ا} = \frac{^{\wedge} \left(\frac{٣-}{٣} ا \right)}{\frac{١}{٤} ا}$$

$$\frac{١}{\frac{١٩}{١٢} ا} = \frac{١}{\frac{٤}{٣} + \frac{١}{٤} ا} = \frac{\frac{٤}{٣} - ا}{\frac{١}{٤} ا} = \frac{\frac{^{\wedge}}{٦} - ا}{\frac{١}{٤} ا} =$$

(١ - ٦) الجذور

نسمي العدد $\frac{١}{٥}$ الجذر النوني للعدد ا ونرمز له بالرمز $\sqrt[٥]{ا}$

$$\sqrt[٥]{ا} = \frac{١}{٥} ا , (ن = ٢, ٣, ٤, \dots)$$

* إذا كان ن عددا زوجيا فان للعدد ا حيث $ا \leq ٠$ جذران نونيان هما $\sqrt[٥]{ا}$ ، $-\sqrt[٥]{ا}$

وعندما ن = ٢ مثلا فان $\sqrt[٢]{ا}$ ، $-\sqrt[٢]{ا}$ يرمزان للجذرين التربيعين للعدد ا

فالجزر التربيعي الموجب للعدد ١٦ هو العدد $\sqrt{16} = 4$

والجزر التربيعي السالب للعدد ١٦ هو العدد $\sqrt{16} = -4$

* إذا كان العدد n فرديا فإن $\sqrt[n]{a}$ هو الجزر النوني الوحيد للعدد a فالجزر

التكعيبي الوحيد للعدد ٨ هو $\sqrt[3]{8} = 2$ والجزر الخامس للعدد - ٢٤٣ هو

العدد $\sqrt[5]{-243} = -3$ لأن $(-3)^5 = -243$

* خواص الجزر النوني

$$(1) \quad \sqrt[n]{a} = (\sqrt[n]{a})^n \quad (2) \quad \sqrt[n]{a} = (\sqrt[n]{a})^n$$

$$(3) \quad \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}} \quad (4) \quad \sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n]{a}^m$$

$$(5) \quad \left. \begin{array}{l} \text{ن عدد زوجي} \\ \text{ن عدد فردي} \end{array} \right\} \sqrt[n]{a} = (\sqrt[n]{a})^n$$

$$(6) \quad \sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a} = (\sqrt[n]{a})^n$$

$$\text{أمثلة} \quad \frac{2}{3} = \frac{\sqrt[3]{8}}{\sqrt[3]{27}} = \sqrt[3]{\frac{8}{27}}$$

$$27 = 3^3 = 3(\sqrt[3]{81}) = \sqrt[3]{(81)^3}$$

$$\frac{1}{9} = 2\left(\frac{1}{3}\right) = 2\left(\frac{1}{243}\sqrt[5]{}\right) = 2\left(\frac{1}{243}\right)$$

مثال

اكتب كلا مما يلي في أبسط صورة :

$$\frac{162}{49}\sqrt{} \quad (ب) \quad 80\sqrt{} + 20\sqrt{} \quad (د)$$

$$128\sqrt[3]{} - 250\sqrt[3]{} + 16\sqrt[3]{} \quad (ج)$$

حل

$$5 \times 16\sqrt{} + 5 \times 4\sqrt{} = 80\sqrt{} + 20\sqrt{} \quad (د)$$

$$5\sqrt{} \times 16\sqrt{} + 5\sqrt{} \times 4\sqrt{} =$$

$$5\sqrt{6} = 5\sqrt{4} + 5\sqrt{2} =$$

$$\frac{2\sqrt{9}}{7} = \frac{2 \times 81\sqrt{}}{7} = \frac{162\sqrt{}}{49} = \frac{162}{49}\sqrt{} \quad (ب)$$

$$2 \times 64\sqrt[3]{} - 2 \times 125\sqrt[3]{} + 2 \times 8\sqrt[3]{} = 128\sqrt[3]{} - 250\sqrt[3]{} + 16\sqrt[3]{} \quad (ج)$$

$$2\sqrt[3]{3} = 2\sqrt[3]{4} - 2\sqrt[3]{5} + 2\sqrt[3]{2} =$$

إزالة الجذر التربيعي من مقام كسر

الأمثلة التالية توضح طريقة إزالة الجذر $\sqrt{}$ من مقام كسر

$$\frac{2\sqrt{3}}{2} = \frac{2\sqrt{3} \times 3}{2\sqrt{3} \times 2\sqrt{3}} = \frac{3}{2\sqrt{3}}$$

$$\frac{15\sqrt{}}{3} = \frac{3\sqrt{} \times 5\sqrt{}}{3\sqrt{} \times 3\sqrt{}} = \frac{5}{3}\sqrt{}$$

ولإزالة الجذور على الصورة $\sqrt{a} \pm \sqrt{b}$ أو $\sqrt{a} \pm \sqrt{b}$ إننا نضرب كلا من بسط ومقام الكسر في مرافق المقام

يسمى المقداران في كل زوج مما يلي مقداران مترافقان

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} \quad , \quad \sqrt{a} - \sqrt{b}$$

$$\sqrt{a} - \sqrt{b} \quad , \quad \sqrt{a} + \sqrt{b}$$

مثال

بسط كلا مما يلي بإزالة الجذر من المقام

$$(أ) \quad \frac{2}{\sqrt{5} + 3\sqrt{2}} \quad (ب) \quad \frac{3}{2\sqrt{5} + 1}$$

حل

$$\frac{\sqrt{5} - 3\sqrt{2}}{\sqrt{5} - 3\sqrt{2}} \times \frac{2}{\sqrt{5} + 3\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{5} + 3\sqrt{2}} \quad (أ)$$

$$\frac{(\sqrt{5} - 3\sqrt{2})^2}{5 - 12} =$$

$$3\sqrt{2} - 5\sqrt{5} = \frac{(\sqrt{5} - 3\sqrt{2})^2}{2 - 9} =$$

$$\frac{2\sqrt{2} + 3}{2\sqrt{2} + 3} \times \frac{2\sqrt{2} + 3}{2\sqrt{2} - 3} = \frac{2\sqrt{2} + 3}{2\sqrt{2} - 3} \quad (ب)$$

$$\frac{2\sqrt{2}^2 + 11}{7} = \frac{2 + 2\sqrt{2}^2 + 9}{7} = \frac{2(\sqrt{2} + 3)}{2 - 9} =$$

تمارين على الفصل الأول

بسط كلا مما يلي

$$\frac{0}{2} \left(\frac{2}{2} \right) \left(\frac{2}{2} \right) \left(\frac{2}{2} \right) \quad (2)$$

$$\frac{\left| \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right|}{1 - \frac{1}{2}} \quad (4)$$

$$\frac{2}{3} \div \left(\frac{2}{4} - \frac{1}{12} \right) \quad (6)$$

$$1 - \left(\frac{1 - \frac{1}{2} + 1 - 1}{1 - 1} \right) \quad (8)$$

$$| \sqrt{10} - \sqrt{8} | \quad (10)$$

$$\frac{(س ص)^2 - (س ص)^2}{(س ص)^2 - (س ص)^2} \quad (12)$$

$$\frac{\sqrt{2} - \sqrt{5}}{\sqrt{2} + \sqrt{5}} \quad (14)$$

$$\frac{\sqrt{3} - 2}{\sqrt{3} + 2} \quad (16)$$

$$\frac{4}{\sqrt{5} - 1} \quad (18)$$

$$\frac{\frac{2}{9} - 2 \left(\frac{1}{3} - 1 \right)}{\frac{2}{9} - \frac{2}{3}} \quad (1)$$

$$\frac{\frac{1}{2} \left(\frac{8}{27} \right) \frac{2}{2} \left(\frac{4}{20} \right)}{\frac{1}{2} \left(\frac{9}{64} \right)} \quad (3)$$

$$\frac{1}{2} \left(\frac{2 - \frac{1}{2}}{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}} \right) \quad (5)$$

$$1 - (2 - 5) \quad (7)$$

$$1 - (1 - 4 + 1 - 3 + 1 - 2) \quad (9)$$

$$\frac{\frac{1}{س} + \frac{1}{1 + س}}{\frac{1}{س} - \frac{1}{1 + س}} \quad (11)$$

$$\frac{3}{\sqrt{2} - 5} \quad (13)$$

$$\frac{19}{11\sqrt{2} - 7} \quad (15)$$

$$\frac{2}{\sqrt{3} + 1} \quad (17)$$

مسائل مختارة لاختبار القدرات عن الفصل الأول

$$= {}^1(2) + {}^1(2-) (1)$$

$$\frac{1}{32} (د) \quad 22 (ج) \quad 22- (ب) \quad \text{صفر (ا)}$$

$$= \frac{2-}{0} (32-) - \frac{1}{2} (27) (2)$$

$$\frac{8}{71} (د) \quad \frac{72}{8} (ج) \quad \frac{71}{8} (ب) \quad \frac{8}{37} (ا)$$

$$= 0. \sqrt{3} - \frac{1}{\sqrt{2}} (3)$$

$$\sqrt{2} \sqrt{10} (د) \quad \sqrt{2} \sqrt{10-} (ج) \quad \sqrt{2} \sqrt{28} (ب) \quad \frac{\sqrt{2} \sqrt{29-}}{2} (ا)$$

$$= {}^1(\sqrt{-})\sqrt{1} + {}^1(\sqrt{-})\sqrt{4} (4)$$

$$4 (د) \quad 4- (ج) \quad 10 (ب) \quad 10- (ا)$$

$$= {}^0(\sqrt{-})\sqrt{0} (5)$$

$$\text{ليس أي مما ذكر (د)} \quad 0 (ج) \quad 3 (ب) \quad 2- (ا)$$

$$= \frac{\frac{3}{4} + \frac{2}{5}}{\frac{3}{5} - \frac{2}{3}} (6)$$

$$1- (د) \quad 10 (ج) \quad \frac{71}{4} (ب) \quad \frac{4}{71} (ا)$$

$$= \sqrt[2]{(\sqrt[2]{24} \sqrt{+5} \sqrt{ })} (7)$$

$$\sqrt[2]{(\sqrt[2]{3} \sqrt{ } - \sqrt[2]{2} \sqrt{ })} (8)$$

$$\sqrt[2]{(\sqrt[2]{24} \sqrt{ } - 5 \sqrt{ })} (9)$$

$$= \frac{\sqrt[2]{2} \sqrt{ } - 1}{\sqrt[2]{2} \sqrt{+1}} (10)$$

$$\sqrt[2]{(\sqrt[2]{3} \sqrt{ } + \sqrt[2]{2} \sqrt{ })} (11)$$

$$\sqrt[2]{(\sqrt[2]{3} \sqrt{ } + \sqrt[2]{2} \sqrt{ })} (12)$$

$$\sqrt[2]{2} \sqrt{+3} - (13) \quad \sqrt[2]{2} \sqrt{2} - 3 - (14) \quad \sqrt[2]{2} \sqrt{2} + 3 (15) \quad \sqrt[2]{2} \sqrt{2} - 3 (16)$$

$$= \sqrt[2]{216} \sqrt[2]{\text{ص}^{\circ} \text{ص}} (17)$$

$$\sqrt[2]{\text{ص}^{\circ} \text{ص}} \sqrt[2]{\text{ص}^{\circ} \text{ص}} (18)$$

$$\sqrt[2]{\text{ص}^{\circ} \text{ص}} \sqrt[2]{\text{ص}^{\circ} \text{ص}} (19)$$

$$\sqrt[2]{\text{ص}^{\circ} \text{ص}} \sqrt[2]{\text{ص}^{\circ} \text{ص}} (20)$$

$$\sqrt[2]{\text{ص}^{\circ} \text{ص}} \sqrt[2]{\text{ص}^{\circ} \text{ص}} (21)$$

$$= 1 - \left(\frac{\sqrt[2]{\text{ب}^{\circ} \text{ب}}}{8} \right) \left(\frac{\sqrt[2]{\text{ب}^{\circ} \text{ب}}}{2} \right) (22)$$

$$\frac{1}{\text{ب}} (23)$$

$$\frac{1}{\text{ب}} (24)$$

$$\frac{1}{\text{ب}} (25)$$

$$\frac{1}{\text{ب}} (26)$$

$$= \frac{1}{4} (27) \quad \frac{1}{4} (28) \quad \frac{1}{4} (29)$$

$$22 (30)$$

$$16 (31)$$

$$4 (32)$$

$$2 (33)$$

$$= \frac{1}{\text{س}} + \sqrt[2]{\text{س}^{\circ} \text{س}} (34)$$

$$\frac{1 + |\text{س}| \text{س}}{\text{س}} (35)$$

$$\frac{1 + \sqrt[2]{\text{س}^{\circ} \text{س}}}{\text{س}} (36)$$

$$\frac{1 + \text{س}}{\text{س}} (37)$$

$$\frac{1 + \sqrt[2]{\text{س}^{\circ} \text{س}}}{\text{س}} (38)$$

$$= \frac{2-(3-2)}{4-1} \quad (13)$$

$$\frac{1}{1} \quad (د) \quad \frac{7}{11} \quad (ج) \quad \frac{9}{7} \quad (ب) \quad \frac{9}{7} \quad (أ) \quad (14) = 1 - 2 - 3 = -4$$

$$\frac{2-1-2}{1} \quad (د) \quad 1+2 \quad (ج) \quad 2(1) \quad (ب) \quad \frac{2}{1+2} \quad (أ) \quad (15) \text{ إذا كان } 2 = 3 \text{ فإن } 2-3 = -1$$

$$\frac{8}{8} \quad (د) \quad \frac{8}{8} \quad (ج) \quad \frac{1}{8} \quad (ب) \quad \frac{1}{8} \quad (أ) \quad (16) = \sqrt{\frac{2}{16} + \frac{2}{20}}$$

$$\frac{2}{20} \quad (د) \quad \frac{4}{20} \quad (ج) \quad \frac{9}{20} \quad (ب) \quad \frac{16}{20} \quad (أ) \quad (17) = 3 + 3 = 6$$

$$\frac{1+3}{5} \quad (د) \quad \frac{1-3}{3} \quad (ج) \quad \frac{20}{1+3} \quad (ب) \quad 1 \quad (أ) \quad (18) \text{ إذا كان } 1 = 5, 2 = 3 \text{ فإن } 1-5 = -4$$

$$\frac{1}{2} \quad (د) \quad \frac{1}{2} \quad (ج) \quad \frac{1}{2} \quad (ب) \quad \frac{1}{2} \quad (أ) \quad (19) \text{ إذا كان } 3 = 4, 2 = 3 \text{ فإن } 4-3 = 1$$

$$\frac{12}{7} \quad (د) \quad \frac{7}{12} \quad (ج) \quad \frac{12}{7} \quad (ب) \quad \frac{144}{7} \quad (أ)$$

$$(٢٠) \text{ إذا كان } s \neq 2 \text{ فإن } \frac{s^2 - 8}{s + 2} =$$

- (أ) $s - 4$ (ب) $s + 4$ (ج) $s^2 - 4$ (د) $s^2 - 4$

(٢١) إذا كان ناتج ضرب الأعداد الصحيحة ٢، ٣، ٠، ٠، ٠، ٠، ١٥ يساوي ل

فان ل ليس مضاعفا للعدد

- (أ) ٥٧ (ب) ٦٥ (ج) ٧٢ (د) ٨٤

$$(٢٢) \text{ إذا كان } \frac{a}{b} \neq 0 \text{ فإن } \frac{\frac{a}{b} + \frac{b}{a} + \frac{a}{b}}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{a}} =$$

- (أ) $a + b + \frac{a}{b}$ (ب) $\frac{a}{b}$ (ج) $\frac{1}{a + b + \frac{a}{b}}$ (د) $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} + \frac{a}{b}$

(٢٣) إذا كان أ، ب عدنان صحيحان بحيث $a + b = 5$ فان العبارة الصحيحة فيما يلي هي :

(١) ناتج ضرب أ، ب عدد فردي

(٢) إذا كان أ عددا فربما فان ب عدد زوجي

(٣) إذا كان $a > 0$ فان $b < 0$

(أ) (١) فقط صحيحة (ب) (٢) فقط صحيحة (ج) (١) و (٢) فقط (د) (٢) و (٣) فقط

$$(٢٤) \text{ إذا كان } \frac{1}{4} \geq s \geq \frac{1}{5} \text{ ، } \frac{1}{3} \geq s \geq \frac{1}{4} \text{ فان القيمة}$$

الصغرى للمقدار s^2 هي

- (أ) $\frac{1}{16}$ (ب) $\frac{1}{32}$ (ج) $\frac{1}{48}$ (د) $\frac{1}{70}$

(٢٥) إذا كان المتوسط الحسابي لستة أعداد يساوي ٢٤ وكان مجموع أربعة من هذه الأعداد

يساوي ١٠٦ فان المتوسط الحسابي للباقيين يساوي

- (أ) ١٢ (ب) ١٩ (ج) ٤٨ (د) ٧٢

الفصل الثاني

الحدوديات

96618707 - 110-102-101 - كيمياء - القدرات - اختبار

الفصل الثاني

الحدوديات

يشتمل هذا الفصل على تعريف الحدودية ، العمليات على الحدوديات وحل بعض المعادلات

(٢ - ١) تعريف الحدودية

ليكن n عددا صحيحا غير سالب ، نسمى حدودية في المتغير s كل تعبير على الصورة

$$a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0$$

حيث $a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0$ هي أعداد حقيقية تسمى معاملات الحدودية

ويسمى العدد n درجة الحدودية

أمثلة :

$$1 - \frac{3}{4}s - 5 \quad \text{حدودية من الدرجة الأولى (حدودية خطية)}$$

$$2 - 3s^2 - 2s + 16 \quad \text{حدودية من الدرجة الثانية (حدودية تربيعية)}$$

$$3 - \sqrt[3]{e} - \pi e^2 - 17 \quad \text{حدودية من الدرجة الخامسة}$$

$$4 - s + \frac{1}{2} - 5 \quad \text{ليست حدودية لأن } n = \frac{1}{2} \text{ ليس عددا صحيحا}$$

(٢ - ٢) العمليات على الحدوديات

(١) عملية الجمع

نجمع معاملات الحدود المتشابهة كما في المثال التالي

$$(7s^2 + 5s - 3) + (2s^3 + 3s^2 - 7s + 5)$$

$$= 2s^3 + 7s^2 - 2s + 5$$

(٢) عملية الطرح

نطرح معاملات الحدود المتشابهة في الحدوديتين

مثال اطرح $٥س^٢ + ٤س - ٤$ من $٣س^٢ - ٥س + ٢$

$$٢س^٢ - ٥س + ٢ - (٥س^٢ + ٤س - ٤) = ٢س^٢ - ٥س + ٢ - ٥س^٢ - ٤س + ٤ = -٣س^٢ - ٩س + ٦$$

(٣) عملية الضرب

نضرب حدوديتين فإننا نضرب كل حد من إحداهما في كل حد من الأخرى مع مراعاة

قوانين الأسس. المثال التالي يوضح طريقة ضرب وحيد الحد (حدودية ذات حد واحد)

في حدودية

$$٣س^٢ (٧ + ٣س - ٢س^٢) = ٣س^٢ (٧) + ٣س^٢ (٣س) - ٣س^٢ (٢س^٢) = ٢١س^٢ + ٩س^٣ - ٦س^٤$$

$$= ٢١س^٢ + ٩س^٣ - ٦س^٤$$

مثال أوجد ناتج الضرب $(٤ - ٣س) (٨ + ٧س - ٢س^٢)$

$$(٤ - ٣س) (٨ + ٧س - ٢س^٢) = ٣٢ - ٢٨س + ٨س^٢ - ٢٤س + ٢١س^٢ - ٦س^٣ = ٣٢ - ٥٢س + ٢٩س^٢ - ٦س^٣$$

$$= ٣٢ - ٥٢س + ٢٩س^٢ - ٦س^٣$$

$$= ٣٢ - ٥٢س + ٢٩س^٢ - ٦س^٣$$

متطابقات هامة

المتطابقات التالية تستخدم في عملية الضرب

$$(١) (١ + ب)^٢ = ١ + ٢ب + ب^٢ \quad \text{مربع كامل}$$

$$(٢) (١ - ب)^٢ = ١ - ٢ب + ب^٢ \quad \text{مربع كامل}$$

$$(٣) (١ + ب)^٣ = ١ + ٣ب + ٣ب^٢ + ب^٣$$

$$(٤) (١ - ب)^٣ = ١ - ٣ب + ٣ب^٢ - ب^٣$$

$$(5) \quad (a+b)(a-b) = a^2 - b^2 \quad \text{الفرق بين مربعين}$$

$$(6) \quad (a+b)(a^2 - ab + b^2) = a^3 + b^3 \quad \text{الجمع بين مكعبين}$$

$$(7) \quad (a-b)(a^2 + ab + b^2) = a^3 - b^3 \quad \text{الفرق بين مكعبين}$$

مثال أوجد ناتج الضرب في كل مما يلي

$$(1) \quad (9 + 2s)(9 - 2s) = 9^2 - (2s)^2 = 81 - 4s^2$$

$$(2) \quad (2s^2 - 3s)(2s^2 + 3s) = (2s^2)^2 - (3s)^2 = 4s^4 - 9s^2$$

$$= 4s^4 - 9s^2 + 12s^2 - 9s^2$$

$$(3) \quad (5 - s)^2 = 5^2 - 2(5)(s) + s^2 = 25 - 10s + s^2$$

$$= 25 - 10s + s^2$$

$$(4) \quad (2s^2 + 3s)(2s^2 + 3s) = (2s^2)^2 + 2(2s^2)(3s) + (3s)^2 = 4s^4 + 12s^3 + 9s^2$$

$$= 4s^4 + 12s^3 + 9s^2$$

تمارين

أوجد ناتج ما يلي

$$(1) \quad (2 - 5v)^2$$

$$(2) \quad (1 + 3e)^2$$

$$(3) \quad (3s - 2v)(3s + 2v)$$

$$(4) \quad (1 + 2e + 3v)^2$$

$$(5) \quad (s + 1 + v)(s + 1 - v)$$

$$(6) \quad (2s - v)(2s + v)$$

$$(7) \quad [s(1 + s) - 2]^2$$

$$(8) \quad [b(2 + b) + 2]^2$$

(٢ - ٣) تحليل الحدوديات

$$٦ - ٥س - ٦س^٢ = (٣ - ٢س) (٢ + ٣س)$$

وهذه تكتب على الصورة التالية

$$٦س^٢ - ٥س - ٦ = (٣ - ٢س) (٢ + ٣س)$$

وفي هذه الحالة نقول إننا قمنا بتحليل الحدودية $٦س^٢ - ٥س - ٦$

إلى العاملين $٣ + ٢س$ ، $٣ - ٢س$

يمكن تحليل الحدودية $٦س^٢ - ٩س$ كما يلي

$$٦س^٢ - ٩س = ٣س (٢س - ٣)$$

ولكن عملية التحليل ليست كاملة لأنه يمكن تحليل العامل $٢س - ٣$ إلى عاملين هما

$٣ - ٢س$ ، $٣ + ٢س$ وبالتالي فإن الصورة النهائية للتحليل هي

$$٦س^٢ - ٩س = ٣س (٣ - ٢س) (٣ + ٢س)$$

فيما يلي نورد بعض الطرائق التي تستخدم في تحليل الحدوديات

(١) التحليل بإخراج العامل المشترك بين الحدود

أمثلة توضيحية

$$٦س^٢ + ٩س = ٣س (٢س + ٣)$$

$$٢٧س^٢ - ٩س - ٦ = ٣س (٩س - ٣ - ٢)$$

$$٤س^٢ - ٦س - ٨ = ٢س (٢س - ٣ - ٤)$$

٢ (التحليل بالمحاولة والخطأ

أمثلة توضيحية

١

$$س^2 - ٨س + ١٥ = (س - ٣)(س - ٥)$$

$$س^2 + س - ٦ = (س + ٣)(س - ٢)$$

$$٢س^2 + ١٣س - ١٥ = (٢س - ١٥)(س + ١)$$

٣ (المربع الكامل

$$٢ + ٢أب + ب^2 = (أ + ب)^2$$

$$٢ - ٢أب + ب^2 = (أ - ب)^2$$

أمثلة توضيحية

$$٤س^2 - ١٢س + ٩ = (٢س - ٣)^2$$

$$= (٢س - ٣)^2$$

$$س^4 + ٢س^2ص + ص^4 = (س^2 + ص)^2$$

$$= (س^2 + ص)^2$$

٤ (الفرق بين مربعين

$$أ^2 - ب^2 = (أ - ب)(أ + ب)$$

أمثلة توضيحية

$$س^2 - ١٦ = (س - ٤)(س + ٤)$$

$$٤س^2 - ٩ = (٢س - ٣)(٢س + ٣)$$

$$٤س^2ص - ٢٥ = (٢سص - ٥)(٢سص + ٥)$$

$$= (٢سص - ٥)(٢سص + ٥)$$

٥ (الفرق والجمع بين مكعبين

$$^2a - ^2b = (a - b)(^2a + ^2ab + ^2b)$$

$$^2a + ^2b = (a + b)(^2a - ^2ab + ^2b)$$

أمثلة توضيحية

$$^8س + ^2٢٧ = (^2٣) + (^2س٢) = (^2٣ + س٢) (٣ + س٢ - س٤) = ٩ + س٦$$

$$^2س٢ص - ١٠٠٠ = (^2س٢ص - ١٠٠٠)$$

$$= (١٠ - س٢ص) (١٠٠ + س٢ص + ١٠س٢ص)$$

٦ (التحليل علي خطوات

أمثلة توضيحية

$$^3س٣ - ١٢س٢ص = (^3س٣ - ١٢س٢ص)$$

$$= (^3س٣ - ١٢س٢ص) (س٢ + س٢ص)$$

$$س٢ - س٢ص = (^2س٢ص - ^2س٢ص) = (^2س٢ص - ^2س٢ص) (س٢ + س٢ص)$$

$$= (س٢ - س٢ص) (س٢ + س٢ص) (س٢ + س٢ص)$$

أو

$$س٢ - س٢ص = (^2س٢ص - ^2س٢ص) = (^2س٢ص - ^2س٢ص) (س٢ + س٢ص)$$

$$= (س٢ - س٢ص) (س٢ + س٢ص) (س٢ + س٢ص)$$

٧ (التحليل بتجميع الحدود

$$^2ا - ٤اب + ٤ب - ج = (^2ا - ٤اب + ٤ب - ج)$$

$$= (٢ - ا) (٢ - ب) (ج - ا)$$

تمارين

حل كلا مما يلي (تحليلًا كاملاً)

- (١) $\frac{1}{4} - 9ب'$ (٢) $١ + م٦ + ٩م'$
- (٣) $س٢ص' + س٢ص' + ٢س٢ص'$ (٤) $٦س٢ - ٥س - ٦$
- (٥) $٥س٢ - ٢٠س$ (٦) $٦س٢ + ٤س٢ص' + ٤س٢ص' - س٢ص'$
- (٧) $٥ + ٧ل٢ - ٢ل٢$ (٨) $٦س٢ - ٦س٢ص' + ٩س٢ص' + ٤س٢ - ١٢ص$
- (٩) $٣س٢ - ١٨س + ٢٧$ (١٠) $٢س٢ - ٢س٢ - س٢$

(٢ - ٤) المقادير النسبية

نسمي مقداراً نسبياً كل تعبير على الصورة $\frac{د(س)}{ل(س)}$

حيث د(س) ، ل(س) هما حدوديتان ، ل(س) $\neq ٠$

المقادير التالية هي أمثلة على المقادير النسبية :

$$\frac{س٢ + ٤س}{١١ + ٥س٢} ، \frac{٥ + ٣س٢}{٧ - ٢س + ٣س٢} ، \frac{س}{٣ + ٢س}$$

يكون المقدار النسبي $\frac{د(س)}{ل(س)}$ في أبسط صورة إذا لم يكن هناك عامل مشترك

بين الحدوديتين د(س) ، ل(س)

فالمقدار $\frac{س}{٢ + س}$ في أبسط صورة بينما $\frac{س٢}{س٢ + ٣س}$

ليس في أبسط صورة لأن $\frac{س}{٣ + س} = \frac{س٢}{(٣ + س)س} = \frac{س٢}{س٢ + ٣س}$

مثال اختصر كلا مما يلي إلى أبسط صورة :

$$(1) \quad \frac{س^2 + 7س + 10}{س^2 - 25} \quad (ب) \quad \frac{س^2 + 5س - 3}{س^2 + س - 2}$$

حل

$$(1) \quad \frac{(س + 2)(س - 5)}{(س - 5)(س + 5)} = \frac{س^2 + 7س + 10}{س^2 - 25}$$

$$(ب) \quad \frac{(س + 3)(س - 2)}{(س + 2)(س - 2)} = \frac{س^2 + 5س - 3}{س^2 + س - 2}$$

$$\frac{س + 3}{س + 2} =$$

جمع وطرح المقادير النسبية

يتم جمع وطرح المقادير النسبية بنفس الطريقة المتبعة في جمع و طرح الكسور

حيث نبدأ بإيجاد المقام المشترك الأصغر ثم نستخدم القاعدة :

$$\frac{أ + ب}{ج} = \frac{أ}{ج} + \frac{ب}{ج}$$

أمثلة توضيحية

$$(1) \quad \frac{1 + س^2}{(1-س)^2} + \frac{س^3}{(1+س)(1-س)} = \frac{1 + س^2}{1 + س^2 - س^2} + \frac{س^3}{1 - س^2}$$

$$= \frac{(1+س)(1+س^2)}{(1+س)^2(1-س)} + \frac{س^3(1-س)}{(1+س)^2(1-س)}$$

$$= \frac{1 + س^3 + س^2 + س^3 - س^4}{(1+س)^2(1-س)}$$

$$= \frac{1 + س^5}{(1+س)^2(1-س)}$$

$$\frac{(1+s)^2}{(1+s)(2+s)} - \frac{2s(2+s)}{(2+s)(1+s)} = \frac{2}{2+s} - \frac{2s}{1+s} \quad (2)$$

$$= \frac{2 - 2s(2+s)}{(2+s)(1+s)} = \frac{2 - 4s - 2s^2}{(2+s)(1+s)}$$

$$\frac{2 - 4s - 2s^2}{2 + 2s + s^2 + s^2} = \frac{2 - 4s - 2s^2}{(2+s)(1+s)} =$$

ضرب المقادير النسبية

هنا أيضا نستخدم قاعدة ضرب الكسور لضرب المقادير النسبية

أمثلة توضيحية

$$\frac{2 - s + s^2}{20 - s + s^2} = \frac{(1-s)(2+s)}{(5+s)(4-s)} = \frac{1-s}{5+s} \cdot \frac{2+s}{4-s} \quad (1)$$

$$\frac{(20 - s^2)(3 - s)}{(5+s)(6-s-9)} = \frac{20 - s^2}{6-s-9} \cdot \frac{3 - s}{5+s} \quad (2)$$

$$\frac{s-5}{3} = \frac{(5+s)(5-s)(3-s)}{(3-s)(5+s)(5+s)} =$$

قسمة المقادير النسبية

كما هو الحال في قسمة الكسور فإننا نحول عملية القسمة إلى عملية ضرب

أمثلة توضيحية

$$\frac{2 - s - s^2}{s} \times \frac{1}{4 - s^2} = \frac{s}{2 - s - s^2} \div \frac{1}{4 - s^2} \quad (1)$$

$$\frac{1+s}{(2+s)s} = \frac{(1+s)(2-s)}{s(2+s)(2-s)} =$$

$$\begin{aligned}
 \frac{س^2 + 5س + 6}{س^2 - 5س - 6} \cdot \frac{س^2 - 5س + 4}{س^2 + 6س} &= \frac{س^2 - 5س - 6}{س^2 + 5س + 6} \div \frac{س^2 - 5س + 4}{س^2 + 6س} \quad (2) \\
 &= \frac{(س - 6)(س + 1)(س - 2)}{(س + 6)(س + 1)(س + 2)} = \\
 &= \frac{(س - 6)(س + 2)}{(س + 6)^2}
 \end{aligned}$$

عمليات على المقادير النسبية

في بعض الأحيان قد نستخدم أكثر من عملية على المقادير النسبية

أمثلة توضيحية

$$\frac{س(س + 4)}{س(س + 4)} \cdot \frac{\frac{2}{س} - \frac{2}{س + 4}}{\frac{2}{س} - \frac{2}{س + 4}} = \frac{\frac{2}{س} - \frac{2}{س + 4}}{\frac{2}{س} - \frac{2}{س + 4}} \quad (1)$$

$$\frac{س^2 - 2(س + 4)}{س(س + 4)} =$$

$$\frac{س^2 - 2}{س(س + 4)} = \frac{س^2 - 2س - 2(س + 4)}{س(س + 4)} =$$

$$\frac{س^2 + 2س}{س^2 - 2س} = \frac{\frac{2}{س} + 1}{\frac{2}{س} - 1} = \frac{\frac{2}{س} + 1}{\frac{2}{س} - 1} \quad (2)$$

$$\frac{س}{س^2 - 2س} = \frac{س(س + 2)}{(س + 2)(س - 2)} =$$

$$\frac{\frac{3}{2}(s^2-1)}{\frac{3}{2}(s^2-1)} + \frac{s}{\frac{3}{2}(s^2-1)} = \frac{1}{\frac{1}{2}(s^2-1)} + \frac{s}{\frac{3}{2}(s^2-1)} \quad (3)$$

$$\frac{s-1}{\frac{3}{2}(s^2-1)} = \frac{s^2-1+s}{\frac{3}{2}(s^2-1)} =$$

$$\frac{\sqrt{s-4}}{\sqrt{s-4}} \cdot \frac{\frac{s^2}{\sqrt{s-4}} + \sqrt{s-4}}{s-4} = \frac{\frac{s^2}{\sqrt{s-4}} + \sqrt{s-4}}{s-4} \quad (4)$$

$$\frac{4}{\frac{3}{2}(s-4)} = \frac{s^2+s-4}{\sqrt{s-4}(s-4)} =$$

تمارين

بسط كلا مما يلي

$$\frac{3}{s^3-1} - \frac{s}{s^2-2} \quad (2)$$

$$\frac{s+3}{s^2-4} \cdot \frac{s+2}{s^2-9} \quad (4)$$

$$\frac{\frac{v^2+v-2}{v^2+4v}}{\frac{2v^2-8}{v^2+2v-8}} \quad (6)$$

$$\frac{\frac{s}{s+4} - \frac{s+5}{s+4}}{s} \quad (8)$$

$$\frac{s}{s^2-1} + \frac{4}{1-s^2} \quad (1)$$

$$\frac{s-2}{s} \cdot \frac{3}{s^2-2s} \quad (3)$$

$$\frac{\frac{5}{1-s^2}}{\frac{s}{s^2-1}} \quad (5)$$

$$\frac{\frac{1}{s}-1}{\frac{1}{s}-1} \quad (7)$$

(٢-٥) بعض أنواع المعادلات وطرق حلها

(١) المعادلات الخطية (المعادلات من الدرجة الأولى)

هي كل معادلة تؤول إلى الصورة القياسية

$$اس + ب = ٠ \text{ حيث } ا \neq ٠$$

مثال أوجد مجموعة الحل للمعادلة

$$٦(س - ١) + ٤ = ٧س + ١$$

حل

$$٦س - ٦ + ٤ = ٧س + ١$$

$$٦س - ٢ = ٧س + ١$$

$$٦س - ٧س = ١ + ٢$$

$$-س = ٣ \text{ ومنها } س = -٣$$

∴ مجموعة الحل هي { -٣ }

مثال أوجد مجموعة الحل للمعادلة

$$٢ = \frac{٣س}{٤} + \frac{س}{٣}$$

حل بضرب طرفي المعادلة في ١٢

$$٢٤ = ٩س + ٤س$$

$$٢٤ = ١٣س \text{ ومنها } س = \frac{٢٤}{١٣}$$

∴ مجموعة الحل هي { $\frac{٢٤}{١٣}$ }

(٢) المعادلات التربيعية (المعادلات من الدرجة الثانية)

هي كل معادلة تؤول إلى الصورة القياسية

$$١ \quad \text{أس}^٢ + \text{ب س} + \text{ج} = ٠ \quad \text{حيث} \quad \text{أ} \neq ٠$$

سوف نوضح فيما يلي بعض الطرق المستخدمة لحل المعادلات التربيعية

(١) طريقة التحليل

مثال أوجد مجموعة الحل للمعادلة $\text{س}^٢ - ٢\text{س} - ٦ = ٠$

حل

$$\text{س}^٢ - ٢\text{س} - ٦ = (\text{س} - ٣)(\text{س} + ٢) = ٠$$

$$\text{س} - ٣ = ٠ \quad \text{ومنها} \quad \text{س} = ٣$$

أو

$$\text{س} + ٢ = ٠ \quad \text{ومنها} \quad \text{س} = -٢$$

مجموعة الحل هي $\{ ٣, -٢ \}$

(٢) طريقة الجذر التربيعي

مثال أوجد مجموعة الحل للمعادلة $١٦ = (\text{س} + ٣)^٢$

$$\text{حل} \quad ١٦ = (\text{س} + ٣)^٢ \quad \text{ومنها} \quad \text{س} + ٣ = \pm \sqrt{١٦} = \pm ٤$$

$$\text{س} + ٣ = ٤ \quad \text{ومنها} \quad \text{س} = ١$$

أو

$$\text{س} + ٣ = -٤ \quad \text{ومنها} \quad \text{س} = -٧$$

مجموعة الحل هي $\{ ١, -٧ \}$

(ج) طريقة الإتمام إلى مربع كامل

$$س^2 + ب س = \left(\frac{ب}{2} + س \right)^2 - \frac{ب^2}{4}$$

مثال

أوجد مجموعة الحل للمعادلة $س^2 + 6س - 5 = 0$

حل

$$س^2 + 6س = -(3 + س)^2 + 9$$

$$س^2 + 6س - 5 = 0 \Rightarrow (س + 3)^2 - 14 = 0$$

$$(س + 3)^2 = 14 \Rightarrow س + 3 = \pm \sqrt{14}$$

$$س + 3 = \sqrt{14} \Rightarrow س = \sqrt{14} - 3$$

أو

$$س + 3 = -\sqrt{14} \Rightarrow س = -\sqrt{14} - 3$$

مجموعة الحل هي $\{ \sqrt{14} - 3, -\sqrt{14} - 3 \}$

(د) طريقة المميز

$$أس^2 + ب س + ج = 0$$

$$س = \frac{-ب \pm \sqrt{ب^2 - 4أ ج}}{2أ}$$

يسمى الحد $(ب^2 - 4أ ج)$ المميز

(١) إذا كان $ب^2 - 4أ ج < 0$ فإن للمعادلة جذرين حقيقيين غير متساويين

(٢) إذا كان $ب^2 - 4أ ج = 0$ فإن للمعادلة جذرين حقيقيين متساويين

(٣) إذا كان $ب^2 - 4أ ج > 0$ فإن للمعادلة ليس لها جذورا حقيقية

مثال أوجد مجموعة الحل للمعادلة $٠ = ١ - س + ٢س + ٣س$

حل $١ = ٢ = ٣ = ج = ١ -$

$$٠ < ١٧ = ٨ + ٩ = (١ -) (٢) ٤ - ٢ (٣) = ٢ = ج = ٢ = ٣ = ١ -$$

$$س = \frac{١٧\sqrt{٢} \pm ٣-}{٤} = \frac{٧١\sqrt{٢} \pm ٣-}{(٢)٢}$$

مجموعة الحل هي $\{ \frac{١٧\sqrt{٢} + ٣-}{٤}, \frac{١٧\sqrt{٢} - ٣-}{٤} \}$

(٣) معادلات حدودية ذات درجات عليا

مثال أوجد مجموعة الحل للمعادلة $٠ = ٢ + ٢س - ٣س + ٤س$

حل نضع $ص = ٢س$ فتصبح المعادلة على الصورة

$$٠ = ٢ + ٣ص - ٢ص$$

$$٠ = (١ - ص) (٢ - ص)$$

$$ص - ١ = ٠ \Leftarrow ص = ١ \Leftarrow ١ = ٢س \Leftarrow ١ = س \Leftarrow س = ١ \pm$$

$$أو ص - ٢ = ٠ \Leftarrow ص = ٢ \Leftarrow ٢ = ٢س \Leftarrow ٢ = س \Leftarrow س = ٢ \pm$$

مجموعة الحل هي $\{ ٢\sqrt{٢}, ٢\sqrt{٢} - , ١, ١ - \}$

مثال أوجد مجموعة الحل للمعادلة $٠ = ٩ + س - ٢س + ٣س - ٤س$

$$حل س - ٢س + ٣س - ٢س + ٩ = (س - ٣) (٣ - س) = ٠$$

$$٠ = (٣ - س) (٣ - س) =$$

$$س - ٣ = ٠ \Leftarrow س = ٣$$

$$س - ٣ = ٠ \Leftarrow س = ٣ \Leftarrow ٣ = ٢س \Leftarrow ٣ = س \Leftarrow س = ٣ \pm$$

مجموعة الحل هي $\{ ٣, ٣\sqrt{٢}, ٣\sqrt{٢} - \}$

وهي المعادلات التي تحتوي على جذور

مثال أوجد مجموعة الحل للمعادلة $\sqrt{2s+7} = s+2$

حل $\sqrt{2s+7} = s+2$

$$2s+7 = s^2 + 4s + 4$$

$$s^2 + 2s - 3 = 0$$

$$0 = (s+3)(s-1)$$

$$s+3=0 \text{ ومنها } s=-3$$

أو

$$s-1=0 \text{ ومنها } s=1$$

بالتعويض في المعادلة الأصلية $s=-3$ لا يحقق المعادلة

مجموعة الحل هي $\{1\}$

مثال أوجد مجموعة الحل للمعادلة $\sqrt{2s+6} - \sqrt{s+4} = 1$

حل $\sqrt{2s+6} - \sqrt{s+4} = 1$

$$2s+6 = (s+4) + 2\sqrt{s+4} + 1$$

$$2\sqrt{s+4} = 1+s$$

$$s^2 + 2s + 1 = (s+4)^2$$

$$s^2 - 6s - 15 = 0 = (s-9)(s+5)$$

$$s+5=0 \Rightarrow s=-5 \text{ أو } s-9=0 \Rightarrow s=9$$

بالتعويض $s=-5$ لا يحقق المعادلة الأصلية ، مجموعة الحل هي $\{9\}$

تمارين

أوجد مجموعة الحل بطريقة الإتمام إلى مربع كامل

$$(1) \quad 8s^2 + 9 = 0 \quad (2) \quad 12s^2 - 45 = 0$$

أوجد مجموعة الحل باستخدام قانون المميز

$$\begin{aligned} (3) \quad 2s^2 - 15 = 0 & \quad (4) \quad 5s^2 + 3 = 0 \\ (5) \quad 10s^2 - 11 = 0 & \quad (6) \quad 6s^2 + 2 = 0 \\ (7) \quad 2s^2 - 4 = 0 & \quad (8) \quad 6s^2 - 17 = 0 \\ & \quad (9) \quad 14 = 0 \end{aligned}$$

عبر عن ص بدلالة س

$$\begin{aligned} (9) \quad (2 - s)^2 &= 4s^2 \quad (10) \quad (3s + 9) = s^2 \\ (11) \quad (3s + 9) &= s^2 \quad (12) \quad (2s + 8) = s^2 + 15 \end{aligned}$$

أوجد مجموعة الحل

$$\begin{aligned} (13) \quad \frac{9}{4} &= (1 - s)^2 \quad (14) \quad 12 + s = 2s^2 + 3s \\ (15) \quad 9s^2 - 3s - 1 &= 0 \quad (16) \quad 4 - s = 3 + \sqrt{s} \\ (17) \quad 1 &= \frac{1}{s-2} + \frac{1}{s+2} \quad (18) \quad 1 + \sqrt{s} = 1 + 2\sqrt{s} \end{aligned}$$

مسائل مختارة لاختبار القدرات عن الفصل الثاني

$$1 \quad = (5 + 12س) - (3 + 2س) \quad (1)$$

$$(أ) 4 + 2س \quad (ب) 1 + 4س \quad (ج) 4 (س + 1) \quad (د) 4 (س + 1) \quad (2) = (2س + 3س) \quad (3)$$

$$(أ) 4س - 12س + 9س \quad (ب) 4س + 12س + 9س$$

$$(ج) 4س - 9س \quad (د) 4س + 9س$$

$$= \frac{4 - 2س}{2 - س + 2س} \cdot \frac{2 + س}{2 - س} \quad (3)$$

$$(أ) \frac{1 - س}{1 + س} \quad (ب) \frac{2 + س}{1 - س} \quad (ج) \frac{2 - س}{1 + س} \quad (د) \frac{2 + س}{2 - س}$$

$$= \frac{3}{1 + س} + \frac{5س}{1 - 2س} + \frac{1}{2س} \quad (4)$$

$$(أ) \frac{15س - 6س - 1}{2س - 3س} \quad (ب) \frac{15س - 6س - 1}{2س + 2س}$$

$$(ج) \frac{17س - 6س - 1}{2س + 2س} \quad (د) \frac{17س - 6س - 1}{2س - 2س}$$

$$= \frac{2}{2 + 3س + 2س} - \frac{س}{6 + 5س + 2س} \quad (5)$$

$$(أ) \frac{2 - س}{(2س + 5س + 6) (2س + 3س + 2)} \quad (ب) \frac{3 + س}{(3 - س) (1 + س)}$$

$$(ج) \frac{3 - س}{(3 + س) (1 + س)} \quad (د) \frac{3 - س}{(3 + س) (1 - س)}$$

$$= \frac{س^2 - س - 1}{س^2 + 5س + 6} \div \frac{س^2 - 5س + 4}{س^2 + 6س} \quad (٦)$$

$$\frac{(س+٤)(س-٢)}{٢(س+١)} \quad (ب) \quad \frac{(س-٤)(س+٢)}{٢(س+١)} \quad (ا)$$

$$\frac{س^2 - ٢س + ٨}{٤س + ٢} \quad (د) \quad \frac{س^2 - ٢س - ٨}{٤س + ٢} \quad (ج)$$

$$= \frac{س^2 - ٤}{س^2 - ٣س - ٤} \div \frac{س^2 + ٥س + ٦}{س + ١} \quad (٧)$$

$$\frac{س^2 - س + ١٢}{س - ٢} \quad (ب) \quad \frac{س^2 + س - ١٢}{س - ٢} \quad (ا)$$

$$\frac{س^2 - س - ١٢}{س - ٢} \quad (د) \quad \frac{س^2 + س + ١٢}{س - ٢} \quad (ج)$$

$$= \frac{س^2 - ٣س - ٤}{س^2 - ٢س - ٨} \div \frac{س - ٢}{س - ٤} \quad (٨)$$

$$\frac{١}{س - ٢} \quad (د) \quad \frac{س - ٢}{س + ١} \quad (ج) \quad (ب) \quad \frac{١}{س + ١} \quad (ا)$$

(٩) إن مجموعة الحل للمعادلة $س^2 - ٢٤س + ١٨ = ٠$ هي

$$\left\{ \frac{٢}{٣}, \frac{١}{٢} \right\} \quad (د) \quad \{ ٢, ١ \} \quad (ج) \quad \left\{ \frac{٢}{٣} \right\} \quad (ب) \quad \left\{ \frac{٢}{٣} \right\} \quad (ا)$$

١٠) إذا كان (س + ٢) احد عوامل الحدودية س^٢ - ٢س + ب فإن ب =

- (أ) - ٨ (ب) ١ (ج) ٢ (د) ٣

١

١١) إن مجموعة الحل للمعادلة $\frac{1}{1-s} + 2 = \frac{s}{2+s}$ هي

- (أ) { ١ ، ٢ - } (ب) { ٢ ، ٠ ، ١ - }

- (ج) { $\sqrt{7} \pm 1$ - } (د) { $\sqrt{7} \pm 1$ }

١٢) إن مجموعة الحل للمعادلة $1 = \frac{1}{s-4} - \frac{14}{2+s}$ هي

- (أ) { ١٠ } (ب) { ٥ } (ج) { ١٠ ، ٥ } (د) ϕ

١٣) إن مجموعة الحل للمعادلة $2س^2 - 3س - 1 = 0$ هي

- (أ) { $\frac{\sqrt{13} \pm 3}{4}$ } (ب) { ٣ ، ٣ - } (ج) { $\frac{\sqrt{17} \pm 3}{4}$ } (د) { $\frac{\sqrt{17} - 3}{4}$ }

١٤) إن مجموعة الحل للمعادلة $5 = \sqrt{1+4س} \sqrt{2}$ هي

- (أ) { $\sqrt{31}$ } (ب) { $\sqrt{31} -$ } (ج) { ١ } (د) { $\sqrt{31} \pm$ }

١٥) إن مجموعة الحل للمعادلة $1 = \sqrt{3-س} - \sqrt{5-2س}$ هي

- (أ) { ٠ } (ب) { ٣ } (ج) { ٧ } (د) { ٧ ، ٣ }

١٦) إن مجموعة الحل للمعادلة $س^{\frac{2}{3}} + س^{\frac{1}{3}} - 6 = 0$ هي

- (أ) { ٨ } (ب) { ٢٧ } (ج) { ٨ ، ٢٧ - } (د) { ٢٧ ، ٨ }

(١٧) إن مجموعة الحل للمعادلة $٢س^٢ - ٣س = ٣س$ هي

(أ) $\{٠\}$ (ب) $\{٠, \frac{٣}{٢}\}$ (ج) $\{١ - \}$ (د) $\{-١, ٠, \frac{٣}{٢}\}$

(١٨) إن مجموعة الحل للمعادلة $١٠٠ = ٢(١ + س) + ٢(١ - س)$ هي

(أ) $\{٢\sqrt{٥} \pm \}$ (ب) $\{٥\sqrt{٢} \pm \}$

(ج) $\{-٧, ٧\}$ (د) $\{-٤, ٦\}$

(١٩) أحد حلول المعادلة $س^٤ - ٣س^٢ + ٢ = ٠$ هو

(أ) $\frac{١}{٢} -$ (ب) $\frac{١}{٢}$ (ج) $\sqrt[٣]{٢}$ (د) $\sqrt[٢]{٢}$

(٢٠) قيمة ل الموجبة التي تجعل للمعادلة $٢س^٢ - ل س + ٣ = ٠$ جذران حقيقيان

متساويان هي

(أ) $\sqrt[٦]{٢}$ (ب) $\sqrt[٣]{٢}$ (ج) $\sqrt[٦]{٢}$ (د) $\sqrt[٣]{٢}$

(٢١) قيمة ل التي تجعل $س^٢ + ١٨س - ٢ل$ مربعا كاملا هي

(أ) ٩ (ب) $٩ -$ (ج) $\frac{٨١}{٢} -$ (د) $\frac{٨١}{٢}$

(٢٢) $س^٢ - ٣س + ٤س - ٤ =$

(أ) $(س^٢ + ٤) (س - ١)$ (ب) $(س^٢ + ٤) (س + ١)$

(ج) $(س^٢ - ٤) (س + ١)$ (د) $(س^٢ + ٤) (س - ٤)$

$$= \frac{\frac{2}{s} - \frac{2}{s+h}}{h} \quad (23)$$

$$(أ) \frac{2}{s(s+h)} \quad (ب) \frac{s+h}{2} \quad (ج) \frac{s(s+h)}{2} \quad (د) \frac{2}{s(s+h)}$$

(24) إن باقي قسمة $s^3 + 3s + 5$ على $(s+1)$ هو

(أ) 3 (ب) 0 (ج) 3- (د) 2

(25) إن باقي قسمة $q(s)$ على $(2s-3)$ هو

(أ) $q(s)$ (ب) $q(-3)$ (ج) $q(\frac{3}{2})$ (د) $q(\frac{3}{2})$

الفصل الثالث المتباينات

96618707

الفصل الثالث

المتباينات

١

(٣ - ١) تعريف

ليكن $D (S)$ ، $L (S)$ تعبيران رياضيان في المتغير S . نسمي متباينة في المتغير S كل علاقة من العلاقات التالية

$$\begin{aligned} D (S) > L (S) , \quad D (S) < L (S) \\ D (S) \geq L (S) , \quad D (S) \leq L (S) \end{aligned}$$

أمثلة

$$S - 3 > 9 , \quad S^2 - S \leq 1 + S , \quad S \geq \frac{S^3}{S^2 - 4}$$

نسمي مجموعة الحل لمتباينة المجموعة التي تحتوي على جميع الأعداد التي تحقق المتباينة.

وسوف نجد أن مجموعة الحل للمتباينات تعطى على صورة فترات وفيما يلي نورد وصفا لبعض الفترات الأساسية

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{فترة مفتوحة} & (A, B) = \{ S \in \mathbb{R} : A < S < B \} \\ \text{فترة مغلقة} & [A, B] = \{ S \in \mathbb{R} : A \leq S \leq B \} \\ \text{فترة نصف مفتوحة} & [A, B) = \{ S \in \mathbb{R} : A \leq S < B \} \\ \text{فترة نصف مغلقة} & (A, B] = \{ S \in \mathbb{R} : A < S \leq B \} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{فترات غير منتهية} & \begin{aligned} (-\infty, B) &= \{ S \in \mathbb{R} : S < B \} \\ (A, \infty) &= \{ S \in \mathbb{R} : A < S \} \\ (-\infty, B] &= \{ S \in \mathbb{R} : S \leq B \} \\ [A, \infty) &= \{ S \in \mathbb{R} : A \leq S \} \end{aligned} \\ & \mathbb{R} = (-\infty, \infty) \end{array} \right.$$

(٣ - ٢) خواص المتباينات

لتكن أ، ب، ج، د أعدادا حقيقية

١

(١) إذا كان $أ > ب$ ، $ب > ج$ فإن $أ > ج$

(٢) إذا كان $أ > ب$ ، فإن $أ + ج > ب + ج$

(٣) إذا كان $أ > ب$ ، فإن $أ - ج > ب - ج$

(٤) إذا كان $أ > ب$ ، $ج > د$ فإن $أ + ج > ب + د$

(٥) إذا كان $أ > ٠$ ، $ب > ٠$ ، $ج > د$ فإن $أ ج > ب د$

(٦) إذا كان $أ > ب$ ، $ج < ٠$ فإن $أ ج < ب ج$

(٧) إذا كان $أ > ب$ ، $ج > ٠$ فإن $أ ج < ب ج$

(٨) إذا كان $أ > ٠$ ، $ب > ٠$ فإن $\frac{١}{ب} < \frac{١}{أ}$

(٩) إذا كان $أ > ٠$ ، $ب > ٠$ ، $ن$ عدد صحيح موجب فإن $أ ن > ب ن$

(١٠) إذا كان $أ > ٠$ ، $ب > ٠$ ، $ن$ عدد صحيح موجب فإن $\sqrt[n]{أ} > \sqrt[n]{ب}$

جميع هذه الخواص صحيحة بالنسبة للعلاقات الثلاث الأخرى $< ، \leq ، \geq$

(٣ - ٣) المتباينات من الدرجة الأولى (المتباينات الخطية)

هي كل متباينة تؤول إلى الصورة القياسية

$$أ س + ب < ٠ \quad (٠ > ، ٠ \geq ، ٠ \leq)$$

أمثلة

$$٣ س - ٢ \geq \frac{٢}{٤} \quad ، \quad ١١ - س > ٥ + س$$

مثال أوجد مجموعة الحل للمتباينة $3س - 2 < 5 + س$

حل $3س - 2 < 5 + س$

$3س - 2 < 5 + س$

$2س < 7$ ومنها $س < \frac{7}{2}$

مجموعة الحل هي $(-\infty, \frac{7}{2})$

مثال أوجد مجموعة الحل للمتباينة $3 \leq \frac{5س + 4}{2}$

حل $3 \leq \frac{5س + 4}{2}$

$6 \leq 5س + 4$ ومنها $س \geq 2$

مجموعة الحل هي $[2, \infty)$

(3 - 4) المتباينات من الدرجة الثانية (المتباينات التربيعية)

هي كل متباينة تحول إلى الصورة القياسية

$أس^2 + بس + ج < 0$ ($0 < 0$) $0 \leq 0$ $0 > 0$ $0 \geq 0$

أمثلة

$3س^2 + 2س - 1 > 0$ ، $3س^2 - 2س + 1 \leq 0$

لإيجاد مجموعة الحل لمتباينة من الدرجة الثانية نكتب المتباينة بحيث يكون

معامل $س^2$ موجبا ثم نوجد مجموعة الحل للمعادلة

$أس^2 + بس + ج = 0$ حيث $أ < 0$

وأخيرا نستخدم القاعدة التالية

قاعدة

لتكن L, L_+ مجموعة الحل للمتباينتين

$$As^2 + Bs + C > 0, \quad As^2 + Bs + C < 0 \quad (A < 0)$$

بالاستناد إلى جذور المعادلة $As^2 + Bs + C = 0$

يكون لدينا الحالات التالية :

(١) للمعادلة جذران حقيقيان m_1, m_2 حيث $m_2 > m_1$

$$L = (m_1, m_2), \quad L_+ = C - [m_1, m_2]$$

(٢) للمعادلة جذران حقيقيان متساويان $m_1 = m_2 = m$

$$L = \emptyset, \quad L_+ = C - \{m\}$$

(٣) ليس للمعادلة جذورا حقيقية

$$L = \emptyset, \quad L_+ = C$$

ملاحظة إذا كان في المتباينة $\geq$ أو $\leq$ فإننا نضيف جذور المعادلة إن وجدت

إلى مجموعة الحل

مثال

أوجد مجموعة الحل للمتباينة $2s^3 + 2s^2 - 2 > 0$

$$\text{حل} \quad 2s^3 + 2s^2 - 2 > 0$$

$$2s^3 + 2s^2 - 2 = (s+2)(s^2 - 1) = (s+2)(s-1)(s+1)$$

$$\text{المعادلة } 2s^3 + 2s^2 - 2 = 0 \text{ لها جذران } s_1 = -1, s_2 = 1$$

مجموعة الحل هي $(-\frac{1}{2}, 2)$

ملاحظة

بالاستناد إلى نتيجة المثال السابق يمكننا إيجاد ما يلي

$$(1) \text{ مجموعة الحل للمتباينة } 2س^2 + 3س - 2 \geq 0 \text{ هي } [-2, \frac{1}{2}]$$

$$(2) \text{ مجموعة الحل للمتباينة } 2س^2 + 3س - 2 \geq 0 \text{ هي}$$

$$ح = [-2, \frac{1}{2}] \cup (-\infty, -2) \cup (\frac{1}{2}, \infty)$$

$$(3) \text{ مجموعة الحل للمتباينة } 2س^2 + 3س - 2 \leq 0 \text{ هي}$$

$$ح = (-\infty, -2] \cup [\frac{1}{2}, \infty)$$

مثال

$$\text{أوجد مجموعة الحل للمتباينة } 4س^2 - 4س + 1 > 0$$

$$\text{حل نكتب المتباينة على صورة } 4س^2 - 4س + 1 < 0$$

$$4س^2 - 4س + 1 = (2س - 1)^2$$

$$\text{المعادلة } 4س^2 - 4س + 1 = 0 \text{ لها جذران متساويان } 2س - 1 = 0$$

$$\text{مجموعة الحل هي } ح = \{2\}$$

ملاحظة

$$(1) \text{ إن مجموعة الحل للمتباينة } 4س^2 - 4س + 1 \leq 0 \text{ هي } ح = (-\infty, \infty)$$

$$(2) \text{ إن مجموعة الحل للمتباينة } 4س^2 - 4س + 1 > 0 \text{ هي } \phi$$

$$(3) \text{ إن مجموعة الحل للمتباينة } 4س^2 - 4س + 1 \geq 0 \text{ هي } \{2\}$$

مثال

أوجد مجموعة الحل للمتباينة $-3س^2 + 2س - 5 > 0$

حل نكتب المتباينة على الصورة

$$-3س^2 + 2س - 5 < 0$$

المعادلة $-3س^2 + 2س - 5 = 0$ ليس لها جذور حقيقية

لأن المميز $ب^2 - 4أج = (-2)^2 - 4(-3)(-5) = 4 - 60 = -56 < 0$

وبالتالي فإن مجموعة الحل للمتباينة هي ح

مثال

أوجد مجموعة الحل للمتباينة $2س^2 - 6س + 1 < 0$

حل نكتب المتباينة على الصورة

$$2س^2 - 6س + 1 < 0$$

وبالتالي فإن للمعادلة $2س^2 - 6س + 1 = 0$ جذرين حقيقيين

$$\frac{\sqrt{6} - 3}{2} = 1.5 \quad , \quad \frac{\sqrt{6} + 3}{2} = 1.5$$

مجموعة الحل للمتباينة هي

$$ح = [1.5, 1.5] = \left(\frac{\sqrt{6} - 3}{2}, \frac{\sqrt{6} + 3}{2} \right) \cup \left(\frac{\sqrt{6} + 3}{2}, \frac{\sqrt{6} - 3}{2} \right)$$

ملاحظة

لإيجاد مجموعة الحل لمتباينة من الدرجة الثانية يمكن استخدام جدول لدراسة الإشارات

كما هو موضح في المثال التالي . وهذه الطريقة تستخدم لإيجاد مجموعة الحل لمتباينات

من درجة أعلى من الدرجة الثانية .

مثال أوجد مجموعة الحل لكل متباينة

(أ) $س^2 - 3س < 10$ (ب) $س^2 - 3س + 2 \geq 0$

حل (أ) $س^2 - 3س - 10 < 0 \Leftrightarrow (س - 5)(س + 2) < 0$

ندرس إشارة العاملين $س - 5$ ، $س + 2$ كما يلي :

$س - 5 < 0 \Leftrightarrow س < 5$ ، $س - 5 > 0 \Leftrightarrow س > 5$

$س + 2 < 0 \Leftrightarrow س < -2$ ، $س + 2 > 0 \Leftrightarrow س > -2$

نضع هذه النتائج في جدول كما يلي :

الفترة	$(- \infty, -2)$	$(-2, 5)$	$(5, \infty)$
إشارة $(س - 5)$	-	-	+
إشارة $(س + 2)$	-	+	+
إشارة $(س - 5)(س + 2)$	+	-	+

نستنتج من السطر الأخير في الجدول أن مجموعة الحل للمتباينة هي

$(- \infty, -2) \cup (5, \infty)$

حل (ب) $س^2 - 3س + 2 \geq 0 \Leftrightarrow (س - 1)(س - 2) \geq 0$

كما هو الحال في (أ) نحصل على معلومات نضعها في جدول كما يلي

الفترة	$(-\infty, 1)$	$(1, 2)$	$(2, \infty)$
إشارة $(س - 2)$	-	-	+
إشارة $(س - 1)$	-	+	+
إشارة $(س - 2)(س - 1)$	+	-	+

نستنتج من السطر الأخير في الجدول أن مجموعة الحل للمتباينة هي $[1, 2]$

(٣ - ٥) المتباينات النسبية

هي كل متباينة تؤول إلى الصورة القياسية

$$١ \quad ٠ > \frac{د(س)}{ل(س)} \quad (٠ \leq, ٠ \geq, ٠ <)$$

حيث د (س) ، ل (س) حلوديتان

سوف تقتصر دراستنا على المتباينات النسبية التي تؤول إلى الصورة

$$٠ > \frac{أس + ب}{جس + د} \quad (٠ \leq, ٠ \geq, ٠ <) \quad ٠ < ج$$

و بالاستناد إلى قاعدة ضرب وقسمة الإشارات نجد أن

$$\text{المتباينة } \frac{أس + ب}{جس + د} > ٠ \quad (٠ <) \quad \text{تكافئ المتباينة}$$

(أس + ب) (جس + د) > ٠ أي أن للمتباينتين مجموعة الحل نفسها .

مثال

أوجد مجموعة الحل للمتباينة

$$٠ > \frac{س + ٢}{س - ٣}$$

حل

نوجد مجموعة الحل للمتباينة المكافئة

$$٠ > (س + ٢) (س - ٣)$$

وهي كما نعلم (٢ ، ٣)

مثال أوجد مجموعة الحل للمتباينة $2 \leq \frac{1}{3-s}$

حل $0 \leq 2 - \frac{1}{3-s}$

$$0 \leq \frac{6-s-1}{3-s}$$

$$0 \leq \frac{5-s}{3-s}$$

وبالتالي فإن المتباينة تكافئ المتباينة

$$(2-s)(5-s) \geq 0 \quad \text{حيث } s \neq 3$$

وعليه فإن مجموعة الحل هي $(\frac{5}{2}, 3) \cup (3, 5)$

مثال أوجد مجموعة الحل للمتباينة

$$\frac{2}{5-s} > \frac{1}{1+s}$$

حل $0 > \frac{2}{5-s} - \frac{1}{1+s}$

$$0 > \frac{2-s-5-s}{(5-s)(1+s)}$$

$$0 > \frac{-3-2s}{(5-s)(1+s)}$$

وبالتالي فإن المتباينة تكافئ المتباينة

$$0 < (5-s)(1+s)$$

وعليه فإن مجموعة الحل هي $(-\infty, -1) \cup (5, \infty)$

(٣ - ٦) المتباينات المضاعفة

هي كل متباينة على الصورة

$$ل (س) > د (س) > هـ (س) \quad (أو \geq)$$

حيث ل (س) ، د (س) ، هـ (س) حدوديات أو تعابير نسبية

سوف تقتصر دراستنا على المتباينات المضاعفة بحيث تؤول كل من المتباينتين

$$ل (س) > د (س) \quad ، \quad د (س) > هـ (س)$$

$$\text{إلى الصورة} \quad \frac{أ + ب}{ج + د} > ٠ \quad (٠ < ، ٠ \geq ، ٠ \leq ، ٠ < ، ٠ >)$$

مثال

أوجد مجموعة الحل للمتباينة

$$٧ - ٣ > س - ٤ \geq ١١$$

حل

بالاستناد إلى خواص المتباينات

$$٣ - ٣ > س - ٤ \geq ١٥$$

$$١ - ١ > س - ٤ \geq ٥$$

و بالتالي فإن مجموعة الحل هي $(١ ، ٥]$

مثال

أوجد مجموعة الحل للمتباينة

$$\frac{١}{١ + س} > \frac{١}{٣ - س} > \frac{٣}{٢ + س}$$

حل نوجد أولا مجموعة الحل للمتباينة

$$\frac{1}{3-s} > \frac{3}{2+s}$$

$$0 > \frac{1}{3-s} - \frac{3}{2+s}$$

$$0 > \frac{11 - (3-s)(2+s)}{(3-s)(2+s)}$$

وهذه تكافئ المتباينة $0 < (3-s)(2+s)$

والتي لها مجموعة الحل $L_1 = (-\infty, \frac{2}{3}) \cup (3, \infty)$

نوجد الآن مجموعة الحل للمتباينة

$$\frac{1}{1+s} > \frac{1}{3-s}$$

$$0 > \frac{1}{1+s} - \frac{1}{3-s}$$

$$0 > \frac{4}{(1+s)(3-s)}$$

وهذه تكافئ المتباينة $0 > (1+s)(3-s)$

والتي لها مجموعة الحل $L_2 = (-1, 3)$

وأخيرا فإن مجموعة الحل للمتباينة المضاعفة هي

$$L_1 \cap L_2 = (-1, \frac{2}{3}) \cup (3, \infty)$$

تمارين على الفصل الثالث

$$(1) \quad 2(1-s) \leq 3s \quad (2) \quad 2(s-3) + 5 > 5-s$$

$$(3) \quad 6(2-s) + 11 < 2(2+s+3) \quad (4) \quad 3(s-5) + 10 \leq 5(s+7)$$

$$(5) \quad \frac{s-3}{4} < 1 - \frac{s}{2} \quad (6) \quad \frac{s^3}{2} + 6 > 8 + \frac{s^4-3}{3}$$

$$(7) \quad 2s^2 + 5s - 3 > 0 \quad (8) \quad 3s^2 - s + 4 > 0$$

$$(9) \quad 7s^2 + 2s + 1 \leq 0 \quad (10) \quad 15s^2 - 12s - 8 < 0$$

$$(11) \quad s(10+s^3) < 77 \quad (12) \quad 2s(15+s^4) \geq 27$$

$$(13) \quad s(1-s^3) \geq 4 \quad (14) \quad s(2+s^3) \leq 5$$

$$(15) \quad (14+2s)(2+s) > 270 \quad (16) \quad (8+s)(10+s) < 120$$

$$(17) \quad 3 \leq \frac{2-s^3}{5} < 7 \quad (18) \quad 10 > \frac{11-s^4}{7} > 1$$

مسائل مختارة لاختبار القدرات عن الفصل الثالث

١) إن مجموعة الحل للمتباينة $\frac{s}{4} - 2 < \frac{s+1}{3}$ هي

(أ) $[-4, \infty)$ (ب) $(-4, \infty)$ (ج) $(\infty, 4)$ (د) $(\infty, 4-)$

٢) إن مجموعة الحل للمتباينة $3s - 2 \geq 2s - 5$ هي

(أ) $[\frac{5}{7}, \infty)$ (ب) $(\infty, \frac{7}{5}-]$ (ج) $(\infty, \frac{7}{5}]$ (د) $(\infty, \frac{5}{7}-]$

٣) إن مجموعة الحل للمتباينة $2 \geq 3 - 4s \geq 7$ هي

(أ) $[-\frac{2}{3}, 1-)$ (ب) $(-\frac{2}{3}, 1-]$ (ج) $(-\frac{2}{3}, 2-]$ (د) $[-\frac{1}{4}, 1-]$

٤) إن مجموعة الحل للمتباينة $\frac{3}{5} \geq \frac{3s-2}{2} \geq 1$ هي

(أ) $[\frac{4}{3}, \frac{16}{15}]$ (ب) $[\frac{4}{15}, 0]$ (ج) $[0, \frac{12}{5}]$ (د) $[0, \frac{4}{15}]$

٥) إن مجموعة الحل للمتباينة $s^2 - s \geq 10 + 2s$ هي

(أ) $[5, \infty)$ (ب) $[2, 5-]$ (ج) $[5, 2-]$ (د) $(\infty, 2-]$

٦) إن مجموعة الحل للمتباينة $0 \leq \frac{s+1}{s-1}$ هي

(أ) $[1, 1-]$ (ب) $(1, 1-)$ (ج) $(1, 1-)$ (د) $(1, 1-]$

٧) إن مجموعة الحل للمتباينة $3s^2 - 2 > 5s$ هي

(أ) $(\frac{1}{3}, 2)$ (ب) $(\frac{1}{4}, 2-)$ (ج) $(\frac{1}{3}, 1-)$ (د) $(4, 3-)$

٨) إن مجموعة الحل للمتباينة $\frac{٥س + ٢}{٢س - ٢} \geq ٣$ هي

- (أ) $[-٤, \infty)$ (ب) $[-٢, ٢)$ (ج) $[-٢, ٤]$ (د) $(٢, \infty)$

٩) إن مجموعة الحل للمتباينة $٣س^٢ - ٥س > ١٢$ هي

- (أ) $(-\frac{١}{٤}, ١)$ (ب) $(-\frac{١}{٤}, ٢)$ (ج) $(-\frac{١}{٣}, ١)$ (د) $(\frac{٤}{٣}, ٣)$

١٠) إن مجموعة الحل للمتباينة $\frac{٣س - ٢}{٢س - ٢} \geq \frac{٣س + ٢}{٢س - ٢}$ هي

- (أ) $[-٦, \infty)$ (ب) $[-٦, ٢)$ (ج) $[-٦, ٦]$ (د) $(\infty, ٦)$

١١) إن مجموعة الحل للمتباينة $(١س - ٢)(٢س + ٣) \geq ٤س(٢س - ٢)$ هي

- (أ) $[-\frac{١}{٤}, \frac{١}{٤}]$ (ب) $(-\frac{١}{٤}, \infty)$ (ج) $(\infty, \frac{١}{٤}]$ (د) $(-\frac{١}{٤}, \infty)$

١٢) إن مجموعة الحل للمتباينة $(٢س + ٢)(١س + ١) \geq (٥س + ٢)$ هي

- (أ) $[-٢, ١]$ (ب) $[-٢, ١)$ (ج) $[١, ٢]$ (د) $[-١, ٢)$

١٣) إن مجموعة الحل للمتباينة $\frac{٣س + ٢}{٢س - ٢} \geq ٢$ هي

- (أ) $[-٦, \infty)$ (ب) $[-٦, ٢)$ (ج) $[-٦, ٢]$ (د) $(\infty, ٦]$

١٤) إن مجموعة الحل للمتباينة $٢ > \frac{٣}{١س - ٢} \geq ٤$ هي

- (أ) $[\frac{٥}{٢}, \frac{٧}{٤}]$ (ب) $(\frac{٥}{٢}, \frac{٧}{٤})$ (ج) $(\frac{٧}{٤}, ١)$ (د) $(\frac{٥}{٢}, ١)$

الفصل الرابع القيمة المطلقة

96618707

الفصل الرابع

القيمة المطلقة

في هذا الفصل سوف نعرف القيمة المطلقة ونذكر خواصها ونوضح كيفية إيجاد مجموعة الحل للمعادلة أو للمتباينة التي تحتوي على قيمة مطلقة

(٤ - ١) القيمة المطلقة

تعريف : القيمة المطلقة للعدد الحقيقي s يرمز لها بالرمز $|s|$ حيث

$$\left. \begin{array}{l} s - \text{ إذا كان } s > 0 \\ 0 \\ s \text{ إذا كان } s < 0 \end{array} \right\} = |s|$$

فمثلا

$$4 = |4| , \quad -\frac{7}{2} = \left(-\frac{7}{2}\right) = \left|\frac{7}{2}\right| , \quad 0 = |0|$$

نلاحظ أن القيمة المطلقة لأي عدد حقيقي هي عدد موجب أو صفر

مثال أوجد قيمة $\frac{|s|}{s}$ عندما $s > 0$ ، $s < 0$

حل إذا كان $s > 0$ فإن $|s| = s$ وبالتالي

$$1 = \frac{s}{s} = \frac{|s|}{s}$$

إذا كان $s < 0$ فإن $|s| = -s$ وبالتالي

$$-1 = \frac{-s}{s} = \frac{|s|}{s}$$

أمثلة توضيحية

$\therefore \pi = 3.1417$ فان $\pi - 3 > 0$ وبالتالي

$$3 - \pi = (\pi - 3)^- = \left| \pi - 3 \right|$$

$\therefore \sqrt{2} < \sqrt{3}$ فان $\sqrt{2} - \sqrt{3} < 0$ ، $\sqrt{3} - \sqrt{2} > 0$ وبالتالي

$$0 = (\sqrt{3} - \sqrt{2}) + (\sqrt{2} - \sqrt{3}) = \left| \sqrt{3} - \sqrt{2} \right| - \left| \sqrt{2} - \sqrt{3} \right|$$

(٢-٤) خواص القيمة المطلقة

ليكن a, b عددين حقيقيين

$$0 \leq \left| a \right| \quad (١)$$

$$\left| a \right| = \left| -a \right| \quad (٢)$$

$$\left| a \right| \left| b \right| = \left| ab \right| \quad (٣)$$

$$\frac{\left| a \right|}{\left| b \right|} = \left| \frac{a}{b} \right| \quad (٤)$$

$$a = b \text{ او } a = -b \Leftrightarrow \left| a \right| = \left| b \right| \quad (٥)$$

$$a > b \text{ او } a < b \Leftrightarrow \left| a \right| > \left| b \right| \quad (٦)$$

$$a > b \text{ او } a < b \Leftrightarrow \left| a \right| < \left| b \right| \quad (٧)$$

$$\left| a \right| \geq 1 \geq \left| -a \right| \quad (٨)$$

$$\left| a \right| + \left| b \right| \geq \left| a + b \right| \quad (٩)$$

(٤- ٣) العلاقة بين الجذر التربيعي و القيمة المطلقة

لكل عدد حقيقي س فان

$$|س| = \sqrt{س^2}$$

مثال

اكتب في ابسط صورة $\frac{\sqrt{س^2 + 1}}{س}$ إذا كان $س > ٠$

حل

عندما $س > ٠$ فان $|س| = س$

$$\frac{\sqrt{س^2 + 1}}{س} = \frac{\sqrt{(س^2 + 1)}}{س} = \frac{\sqrt{س^2 + 1}}{س}$$

$$\frac{\sqrt{س^2 + 1}}{س} = \frac{\sqrt{س^2 + 1}}{س} = \frac{\sqrt{س^2 + 1}}{س}$$

مثال

اكتب في ابسط صورة $\frac{\sqrt{س^2 + 1}}{س - ١}$ إذا كان $س < ١$

حل

$$\frac{|س + ١|}{(س + ١)(س - ١)} = \frac{\sqrt{(س + ١)^2}}{س^2 - ١} = \frac{\sqrt{س^2 + ٢س + ١}}{س^2 - ١}$$

(لأن $س + ١ > ٠$)

$$\frac{س + ١}{(س + ١)(س - ١)} =$$

$$\frac{١}{س - ١} =$$

(٤ - ٤) معادلات تحتوي قيمة مطلقة

نستخدم الخاصية (٥)

$$|a| = b \Leftrightarrow a = b \text{ أو } a = -b$$

مثال أوجد مجموعة الحل للمعادلة

$$|3 - x| = 4$$

$$\Leftrightarrow |3 - x| = 4$$

$$3 - x = 4 \text{ أو } 3 - x = -4$$

$$x = -1 \text{ أو } x = 7$$

مجموعة الحل هي $\{-1, 7\}$

مثال أوجد مجموعة الحل للمعادلة

$$|5x + 4| = |3x - 2|$$

$$\Leftrightarrow |5x + 4| = |3x - 2|$$

$$5x + 4 = 3x - 2 \text{ أو } 5x + 4 = -(3x - 2)$$

$$5x + 4 = 3x - 2 \text{ أو } 5x + 4 = -3x + 2$$

$$2x = -6 \text{ أو } 8x = -2$$

$$x = -3$$

$$x = -\frac{1}{4}$$

$$x = -3$$

$$x = -\frac{1}{4}$$

مجموعة الحل هي $\{-3, -\frac{1}{4}\}$

(٤ - ٥) متباينات تحتوي قيمة مطلقة

نستعمل الخاصية (٦) $|a| > b \Leftrightarrow -b < a < b$

أو الخاصية (٧) $|a| < b \Leftrightarrow -b < a < b$ أو $a < -b$

مثال أوجد مجموعة الحل للمتباينة $|3 - s| > 4$

حل $|3 - s| > 4 \Leftrightarrow -4 < 3 - s < 4 \Leftrightarrow -7 < -s < 1 \Leftrightarrow 7 > s > 1$

مجموعة الحل هي $(-1, 7)$

مثال أوجد مجموعة الحل للمتباينة $|s + 4| \leq 2$

حل $|s + 4| \leq 2 \Leftrightarrow -2 \leq s + 4 \leq 2 \Leftrightarrow -6 \leq s \leq -2$

$s \leq -6$ أو $s \geq -2$

مجموعة الحل هي $(-\infty, -6] \cup [-2, \infty)$

مثال أوجد مجموعة الحل للمتباينة $0 < \frac{1}{|3 - s|}$

حل نلاحظ أن $s = \frac{3}{4}$ لا يمكن أن يكون حلاً للمتباينة ومن جهة أخرى نعلم أنه إذا كان

$0 < a > b$ فإن $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ وبالتالي فإن المتباينة تكافئ $|3 - s| > \frac{1}{0}$ حيث $s \neq \frac{3}{4}$

أو $-\frac{1}{0} < 3 - s < \frac{1}{0} \Leftrightarrow -\frac{1}{0} < 3 - s < \frac{1}{0}$

$\Leftrightarrow \frac{1}{0} < s < \frac{7}{0} \Leftrightarrow \frac{1}{0} < s < \frac{7}{0}$

مجموعة الحل هي $(\frac{1}{0}, \frac{3}{4}) \cup (\frac{3}{4}, \frac{7}{0})$

مثال أوجد مجموعة الحل للمتباينة

$$\frac{1}{|7 + س|} > \frac{1}{|4 - س|}$$

حل المتباينة تكافئ

$$|س - 4| < |س + 7| \text{ حيث } س \neq 4, س \neq -7$$

$$(س - 4)^2 < (س + 7)^2$$

$$س^2 - 8س + 16 < س^2 + 14س + 49$$

$$-8س + 16 < 14س + 49$$

$$-22س < 33$$

$$س > -\frac{3}{2}$$

$$\text{مجموعة الحل هي } (-\infty, -7) \cup (-\frac{3}{2}, 4)$$

مثال أوجد مجموعة الحل للمتباينة

$$\frac{1}{2} > \frac{1}{|س - 3|}$$

حل المتباينة تكافئ

$$|س - 3| < 2, س \neq 3$$

$$س - 3 < 2 \text{ أو } س - 3 > 2$$

$$س < 5 \text{ أو } س > 1$$

$$\text{مجموعة الحل هي } (-\infty, 1) \cup (5, \infty)$$

مسائل مختارة لاختبار القدرات عن الفصل الرابع

$$(1) \text{ إذا كان } 1 < s < 2 \text{ فإن } |s-1| - |s-2| =$$

$$(أ) 2-s \quad (ب) s^2+3 \quad (ج) 1 \quad (د) 1-$$

$$(2) \text{ إذا كان } 2 < s < 8 \text{ فإن}$$

$$(أ) |s-3| < 0 \quad (ب) |s-3| > 0 \quad (ج) |s-3| \geq 0 \quad (د) |s-3| \leq 0$$

$$(3) \text{ إذا كان } s > |s| \text{ ، } s^2 + 2s - 3 = 0 \text{ فإن } 2s + 4 =$$

$$(أ) 2- \quad (ب) 2 \quad (ج) 6 \quad (د) 8$$

$$(4) \sqrt[4]{s^2 + s^2 + s^2 + s^2} =$$

$$(أ) s^2 + s \sqrt{s+4} \quad (ب) |s| \sqrt{s+4} \quad (ج) |s| (s+4) \quad (د) s \sqrt{s+4}$$

$$(5) \sqrt[4]{s^2 + s^2} =$$

$$(أ) \frac{\sqrt{s^2 + s^2}}{|s| \sqrt{s}} \quad (ب) \frac{\sqrt[4]{s^2 + s^2}}{s \sqrt{s}} \quad (ج) \frac{s^2 + s^2}{s \sqrt{s}} \quad (د) \frac{s + s^2}{|s| \sqrt{s}}$$

$$(6) = \frac{s}{\sqrt[4]{s^2 + s^2}}$$

$$(أ) \frac{1}{1 + \sqrt{s}} \quad (ب) \frac{1}{1 + s \sqrt{s}} \quad (ج) \frac{s}{(1 + s \sqrt{s}) |s|} \quad (د) \frac{s}{(1 + s \sqrt{s}) |s|}$$

$$(7) \text{ إذا كان } s < 0 \text{ ، } s < 0 \text{ فإن } \sqrt[4]{27} \sqrt[4]{9} s^4 \sqrt{s} =$$

$$(أ) 9s \sqrt{s} \quad (ب) 9s \sqrt[4]{s} \quad (ج) 27s \sqrt{s} \quad (د) 3s^2 \sqrt{s}$$

$$(8) \text{ إذا كان } s > 2 \text{ فإن } \frac{s \sqrt{s^2 + s^2 + s^2 + s^2}}{s^2 - 4} =$$

$$(أ) \frac{s}{s^2 - 2} \quad (ب) \frac{s}{s^2 + 2} \quad (ج) \frac{s}{s - 2} \quad (د) \frac{s -}{s + 2}$$

(٩) إن مجموعة الحل للمتباينة $\sqrt{2s+1} < 3$ هي

(أ) $(-\infty, 2)$ (ب) $(-2, 1)$ (ج) $(-\infty, 1)$ (د) $(-\infty, \infty)$

(١٠) إن مجموعة الحل للمتباينة $|5s+1| < 2$ هي

(أ) $(-\infty, -\frac{3}{5})$ (ب) $(-\infty, -\frac{1}{5})$ (ج) $(-\frac{3}{5}, -\frac{1}{5})$ (د) $(-\infty, \infty)$

(١١) إن مجموعة الحل للمتباينة $|3-4s| > \frac{1}{3}$ هي

(أ) $(-\frac{1}{12}, \frac{1}{12})$ (ب) $(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ (ج) $(\frac{2}{3}, \frac{5}{6})$ (د) $(-\frac{5}{6}, -\frac{2}{3})$

(١٢) إن مجموعة الحل للمتباينة $|2s+1| - |s-5| > 0$ هي

(أ) $(-\frac{4}{3}, 6)$ (ب) $[-\frac{4}{3}, 6]$ (ج) $(-\frac{4}{3}, 6)$ (د) $[-\frac{4}{3}, 6]$

(١٣) إن مجموعة الحل للمتباينة $\frac{5}{4} < \left| \frac{1}{(s-1)} \right|$ هي

(أ) $(\frac{7}{5}, \frac{3}{5})$ (ب) $[\frac{7}{5}, \frac{3}{5}]$ (ج) $(\frac{7}{5}, \frac{3}{5})$ (د) $[\frac{7}{5}, \frac{3}{5}]$

(١٤) إن مجموعة الحل للمتباينة $|s| \leq |s-1|$ هي

(أ) $(-\infty, \frac{1}{4})$ (ب) $(-\infty, \frac{1}{4}]$ (ج) $(\frac{1}{4}, \infty)$ (د) $(\frac{1}{4}, \infty)$

(١٥) إن مجموعة الحل للمتباينة $|3+s| > |s-8|$ هي

(أ) $[\frac{5}{4}, 0)$ (ب) $(\frac{5}{4}, 0)$ (ج) $(\frac{5}{4}, \infty)$ (د) $(\frac{5}{4}, \infty)$

(١٦) إن مجموعة الحل للمتباينة $|2s-3| - |s-1| > 0$ هي

(أ) $(-\infty, \frac{5}{4})$ (ب) $(-\infty, \frac{5}{4})$ (ج) $(\frac{5}{4}, \infty)$ (د) $(\frac{5}{4}, \infty)$

الفصل الخامس الدوال

الفصل الخامس

الدوال الحقيقية

١

(١ - ٥) مقدمة

يعتبر مفهوم الدالة واحدا من أهم المفاهيم الرياضية حيث يلعب دورا أساسيا في مواضيع الحساب . سوف نعطي في هذا الفصل فكرة مختصرة عن مجال تعريف الدالة وتصنيف الدوال والعمليات عليها .

(٢ - ٥) الدوال الحقيقية

نعلم أن الدالة هي علاقة بين مجموعتين بحيث يقترن كل عنصر من المجموعة الأولى بعنصر وحيد من المجموعة الثانية .

سوف نركز اهتمامنا على الدوال الحقيقية أي تلك الدوال التي تكون معرفة على مجموعة الأعداد الحقيقية أو مجموعة جزئية منها وتأخذ قيما حقيقية وفي هذه الحالة نكتفي بذكر قاعدة الاقتران ونرمز للدالة بأحد الرموز

ق (س) ، د (س) ، هـ (س) ، ...

(٣ - ٥) مجال الدالة

نسمي مجموعة جميع قيم س التي تكون لأجلها الدالة د (س) معرفة مجال الدالة .
فالدالة الحدودية معرفة على ح ولذلك فإن مجالها يساوي ح

أمثلة توضيحية

(١) الدالة $D = (S) = \sqrt{S^2 + 6}$ معرفة لكل قيم S

بحيث يكون $S^2 + 6 \geq 0$ أو $S^2 \geq -6$ أو $S \leq -3$ أو $S \geq 3$

و بالتالي فإن مجال الدالة $D = (S)$ هو $[-3, \infty) \cup (3, \infty)$

(٢) الدالة $Q = (S) = \frac{1}{S^2 - 6S - 7}$ معرفة لكل قيم S

بحيث يكون $S^2 - 6S - 7 \neq 0$

$$S^2 - 6S - 7 = (S - 7)(S + 1) = 0$$

عندما $S = 7$ أو $S = -1$

و بالتالي فإن مجال الدالة $Q = (S)$ هو $\{S \mid S \neq 7, S \neq -1\}$

(٣) الدالة $H = (S) = \sqrt[3]{S^3 + 3S}$ معرفة لكل قيم S

و بالتالي فإن مجال الدالة $H = (S)$ هو $\mathbb{R}$

(٥ - ٤) الدوال المعرفة جزئياً

يتم تعريف بعض الدوال بأكثر من قاعدة وفي هذه الحالة نقول عن الدالة إنها معرفة

جزئياً و يكون مجال هذه الدالة مساوياً إلى مجموعة جميع قيم S التي تجعل الدالة

معرفة

و المثل التالي يوضح ذلك

مثال

ليكن

$$\left. \begin{array}{l} \text{س} - 1 \quad \text{إذا كان} \quad 5 \geq \text{س} > 1 \\ \text{س}^2 \quad \text{إذا كان} \quad 1 \geq \text{س} > 2 \\ 6 \quad \text{إذا كان} \quad \text{س} < 2 \end{array} \right\} = (\text{س})$$

بما أن العدد 1 يقع في الفترة $[1, 2)$ فإننا

$$\text{نعتبر } (\text{س}) = \text{س}^2 \text{ لإيجاد } (\text{س}) = (1) = 1$$

وبما أن العدد 5 يقع في الفترة $(2, 5)$ فإننا نجد أن

$$(\text{س}) = 5 \text{ حيث } (\text{س}) = 6 \text{ في هذه الفترة}$$

ولإيجاد $(\text{س}) = 5$ نعتبر $(\text{س}) = \text{س} - 1$ فيكون

$$(\text{س}) = 5 \Rightarrow \text{س} - 1 = 5 \Rightarrow \text{س} = 6$$

نلاحظ أن الدالة غير معرفة عند العدد 2 وأن

مجال الدالة (س) هو $]-5, \infty[- \{2\}$

(5 - 5) تصنيف الدوال

(1) الدالة الثابتة: $(\text{س}) = \text{أ}$ لكل س في مجال الدالة

$$\text{ق } (\text{س}) = 7, \quad (\text{س}) = \frac{5}{4} \text{ هي دوال ثابتة}$$

(2) الدالة الخطية: $(\text{س}) = \text{أ} \text{س} + \text{ب}$ حيث $\text{أ} \neq 0$ ، $\text{ب} \in \mathbb{R}$

$$\text{ق } (\text{س}) = 2 \text{س} - 5, \quad (\text{س}) = \frac{3}{4} \text{س}, \quad (\text{س}) = 5 \text{س} - 1$$

هي دوال خطية

(٣) الدالة التربيعية : $د(س) = أس^٢ + ب س + ج$ ، $أ \neq ٠$

$$د(س) = ٣س^٢ - ١ ، ق(س) = ٥س^٢ + ٢س - ٧$$

١

هي دوال تربيعية

(٤) الدالة الحدودية : $د(س) = أن س^٢ + أن س + + أ١ س + أ٠$

$$د(س) = ٢س^٢ + ٣س + ١ ، هـ(س) = ٥س^٢ + ٤س + ٥$$

هي دوال حدودية . لاحظ أن الدوال الثابتة والخطية و التربيعية هي دوال حدودية

(٥) الدالة النسبية : $د(س) = \frac{ق(س)}{ل(س)}$ ، $ل(س) \neq ٠$

ق(س) ، ل(س) دالتان حدوديتان

$$د(س) = \frac{٢س^٢ + ١}{٣س^٢ + ٧} ، هـ(س) = \frac{٥س^٢ + ٨س + ٢}{٣س^٢ + ٢س - ٥}$$

هي دوال نسبية

(٦) الدالة المحايدة : $د(س) = س$ لكل قيم س في مجال الدالة

(٧) دالة القيمة المطلقة : $د(س) = |س|$ لكل قيم س في مجال الدالة

(٨) الدالة الزوجية : $د(-س) = د(س)$ لكل قيم س في مجال الدالة

$$د(س) = ١ + ٢س^٢ ، ق(س) = ٧س^٢ + ٥س^٢ + ١$$

هي دوال زوجية

(٩) الدالة الفردية : $د(-س) = -د(س)$ لكل قيم س في مجال الدالة

$$د(س) = ٣س^٢ ، ق(س) = -٣س^٢ + س$$

هي دوال فردية

(٥ - ٦) العمليات على الدوال

لتكن د (س) ، هـ (س) دالتين حقيقيتين

١

(١) دالة جمع دالتين

$$(د + هـ) (س) = (س) د + (س) هـ$$

(٢) دالة فرق دالتين

$$(د - هـ) (س) = (س) د - (س) هـ$$

(٣) دالة ضرب دالتين

$$(د هـ) (س) = (س) د (س) هـ$$

(٤) دالة قسمة دالتين

$$\frac{د (س)}{هـ (س)} = (س) \left(\frac{د}{هـ} \right) , هـ (س) \neq ٠$$

ملاحظة

$$\text{مجال } (د + هـ) = \text{مجال } (د - هـ) = \text{مجال } (د هـ) = \text{مجال } د \cap \text{مجال } هـ$$

$$\text{مجال } \frac{د (س)}{هـ (س)} = \text{مجال } د \cap \text{مجال } هـ , هـ (س) \neq ٠$$

مثال

$$\text{ليكن } د (س) = س^٢ + ١ , هـ (س) = \sqrt{س}$$

أوجد الدوال $د + هـ , د - هـ , د هـ , \frac{د}{هـ}$ ومجال كل منها

حل

$$\text{مجال } د (س) = ح , \text{ مجال } هـ (س) = [٠ , \infty)$$

$$(1) (d + h)(s) = d(s) + h(s)$$

$$1 + \sqrt{s} + s = \sqrt{s} + 1 + s =$$

$$\text{مجال } (d + h) = (\infty, 0] \cap C = (\infty, 0]$$

$$(2) (d - h)(s) = d(s) - h(s)$$

$$1 + \sqrt{s} - s = \sqrt{s} - 1 + s =$$

$$\text{مجال } (d - h) = (\infty, 0] \cap C = (\infty, 0]$$

$$(3) (d \cdot h)(s) = d(s) \cdot h(s)$$

$$\frac{1}{s} + \frac{s}{s} = (\sqrt{s}) \cdot (1 + s) =$$

$$\text{مجال } (d \cdot h) = (\infty, 0] \cap C = (\infty, 0]$$

$$(4) \left(\frac{d}{h}\right)(s) = \frac{d(s)}{h(s)}$$

$$\frac{1}{s} + \frac{s}{s} = \frac{1}{\sqrt{s}} + \frac{s}{\sqrt{s}} = \frac{1 + s}{\sqrt{s}}$$

$$\text{مجال } \left(\frac{d}{h}\right) = (\infty, 0] \cap C = \{0\} - (\infty, 0] \cap C = \left(\frac{d}{h}\right)$$

(5 - 7) تركيب الدالتين

إن تركيب الدالتين د، هـ هو دالة يرمز لها بالرمز د هـ حيث

$$(d \circ h)(s) = d(h(s))$$

سوف نوضح من خلال الأمثلة أن

$$(d \circ h) \neq (h \circ d) \text{ بصورة عامة}$$

مثال ليكن $d = (س) = س^2 - 3س$ ، $ه = (س) = س^2 + 1$

أوجد كلامن ده ه ، ه ه د

الحل $(ده ه) = (س) = س^2 - 3س$ ، $(ه ه د) = (س) = س^2 + 1$

$$(ده ه) = (س) = س^2 - 3س$$

$$= س^2 - 3س - 1 + س + 1 = س^2 - 2س$$

$$= س^2 - 2س - 2$$

$$(ده ه) = (س) = س^2 - 3س$$

$$= س^2 - 3س - 1 + س + 1 = س^2 - 2س$$

$$= س^2 - 2س - 2$$

لاحظ أن $(ده ه) \neq (س) = س^2 - 3س$

مثال

$$\text{ليكن } d = (س) = \frac{س}{1+س} ، ه = (س) = \frac{2}{1-س}$$

أوجد كلامن ده ه ، ه ه د

الحل

$$(ده ه) = (س) = \frac{س}{1+س} = \left(\frac{2}{1-س} \right) d = \left(\frac{2}{1-س} \right) \left(\frac{2}{1-س} \right) = \frac{4}{(1-س)^2}$$

$$\frac{2}{1+س} = \frac{2}{1-س+2س} =$$

$$(ه ه د) = (س) = \frac{2}{1-س} = \left(\frac{س}{1+س} \right) ه = \left(\frac{س}{1+س} \right) \left(\frac{2}{1-س} \right) = \frac{2س}{(1+س)(1-س)}$$

$$= \frac{2س}{1-س^2} = \frac{2(1+س)}{1-س^2} = \frac{2(1+س)}{(1-س)(1+س)} = \frac{2}{1-س}$$

مسائل مختارة لاختبار القدرات عن الفصل الخامس

(١) إذا كان

$$\left. \begin{array}{l} \text{عندما } s > 1 \\ \text{عندما } s \leq 1 \end{array} \right\} \begin{array}{l} |2 - 3s| + 1 \\ \frac{1}{3}(3 + 4s) \end{array} = (s) \text{ ق}$$

فإن ق(٦) - ق(١) =

(أ) ٣ - (ب) ٣ (ج) ٩ (د) ٨١

(٢) إذا كان د (س) = س^٢ - س^٣ + ٢ ، هـ (س) = س^٤ - ١

فإن (د هـ) (١ -) =

(أ) ٤٢ (ب) ٢٠ - (ج) ٣٠ (د) ١٨

(٣) إذا كان ق (س) = $\frac{6 + 3s}{3 + s}$ فإن ق (٢ + م)

(أ) $\frac{6 + 3m}{3 + m}$ (ب) $\frac{8 + 3m}{5 + m}$ (ج) $\frac{12 + 3m}{5 + m}$ (د) $\frac{12 + 3m}{3 + m}$

(٤) إذا كان د (س) = س^٢ - س^٢ فإن د (١ - $\sqrt{3}$) =

(أ) $\sqrt{3} + ٧$ (ب) $\sqrt{3} - ٧$ (ج) $\sqrt{3} - ٥$ (د) $\sqrt{3} + ٥$

(٥) إذا كان هـ (س) = ٤ - س^٢ فإن $\frac{هـ(س + ل) - هـ(س)}{ل} =$

(أ) ٢ - س - ل (ب) ٢ + س + ل (ج) ٢ - س + ل (د) ٢ - س - ل

(٦) إذا كان ق (س) = $\frac{٥}{س}$ فإن $\frac{ق(س) - ق(ل)}{س - ل} =$

(أ) $\frac{٥}{ل س}$ (ب) $\frac{٥}{ل س} -$ (ج) $\frac{ل س}{٥} -$ (د) ٥ ل س

$$(٧) \text{ إذا كان د (س) } = \frac{١-س}{١+س} \text{ فإن د (س+١) + د (}\frac{٢}{س}\text{) = (}\frac{٢}{س}\text{)}$$

$$(أ) \frac{١}{١+س} \quad (بأ) \frac{١}{٢+س} \quad (ج) \frac{٢}{١+س} \quad (د) \frac{٢}{٢+س}$$

$$(٨) \text{ إن مجال الدالة ق (س) } = \sqrt{٣-س} + \sqrt{٢-س} \text{ هو}$$

$$(أ) (٣، \infty) \quad (ب) (-\infty، ٣] \quad (ج) [٢، ٣] \quad (د) [٢، \infty)$$

$$(٩) \text{ إن مجال الدالة ق (س) } = \sqrt[٣]{٢س-٢} \text{ هو}$$

$$(أ) (-\infty، ٠) \quad (ب) (-\infty، ٠) \cup [٠، \infty) \quad (ج) [٠، ٢] \quad (د) [٢، \infty)$$

$$(١٠) \text{ إن مجال الدالة ق (س) } = \frac{\sqrt[٣]{٢س-٢}}{١-س} \text{ هو}$$

$$(أ) [١، ١-) \quad (ب) [١، ٢-) \quad (ج) [١، ٢-) \quad (د) (١، ٢-)$$

$$(١١) \text{ إن مجال الدالة ق (س) } = \sqrt[٣]{١+س} + \sqrt{١-س} \text{ هو}$$

$$(أ) (١، \infty) \quad (ب) (١، \infty) \quad (ج) [١، ١-) \quad (د) (-\infty، ١-]$$

$$(١٢) \text{ إذا كان د (س) } = ٣س - ٢، هـ (س) = ٢س - ٢ \text{ فإن د هـ (س) = (س)}$$

$$(أ) ٩س - ٢ - ٨ \quad (ب) ٩س - ٢ + ٨$$

$$(ج) ٩س - ٢ - ٨ \quad (د) ٩س - ٢ - ٤$$

$$(١٣) \text{ إذا كان ق (س) } = \frac{س}{١+س}، ل (س) = ١ - ٢س \text{ فإن ل هـ ق (س) = (س)}$$

$$(أ) \frac{١-س}{١+س} \quad (ب) \frac{١-س}{١+س} \quad (ج) \frac{٢-س}{١+س} \quad (د) \frac{٢}{١+س}$$

$$(14) \text{ إذا كان د (س) = س}^2 \text{، ق (س) = } \sqrt{1-3\text{س}} \text{ فإن (د ه ق) (س) =}$$

$$(أ) (1-3\text{س})^2 \quad (ب) \sqrt{1-3\text{س}} \quad (ج) 1-3\text{س} \quad (د) \sqrt{1+3\text{س}}$$

$$(15) \text{ إذا كان هـ (س) = } \sqrt{3+3\text{س}} \text{، د (س) = } |1+3\text{س}| \text{ فإن (د هـ ق) (س) =}$$

$$(أ) |1+3\text{س}| \quad (ب) \sqrt{3+3\text{س}} \quad (ج) \sqrt{1+3\text{س}} \quad (د) \sqrt{3+3\text{س}}$$

$$(16) \text{ إذا كان د (س) = } \frac{1}{\text{س}} \text{، ق (س) = } \sqrt{3\text{س}} \text{، هـ (س) = س}^2 + 2\text{س} + 1$$

$$\text{فإن (د هـ ق) (س) =}$$

$$(أ) \frac{1}{1+3\text{س}} \quad (ب) \frac{1}{|1+3\text{س}|} \quad (ج) 1+3\text{س} \quad (د) |1+3\text{س}|$$

$$(17) \text{ إذا كان ل (س) = } \sqrt{1+3\text{س}} \text{ فإن } \frac{\text{ل (س + هـ) - ل (س)}}{\text{هـ}} =$$

$$(أ) \frac{1}{2\sqrt{3\text{س}+1}} \quad (ب) \frac{1}{2\sqrt{3\text{س}+1}}$$

$$(ج) \sqrt{1+3\text{س}} \quad (د) \frac{1}{\sqrt{1+3\text{س}} + \sqrt{1+3\text{س}+2\text{س}+1}}$$

$$(18) \text{ إذا كان ق (س) = س}^2 + 1 \text{ فإن } \frac{\text{ق (س + هـ) - ق (س)}}{\text{هـ}} =$$

$$(أ) 2\text{س} \quad (ب) 2\text{س} + \text{هـ} \quad (ج) 2\text{هـ} + \text{س} \quad (د) \text{ليس أيا مما سبق}$$

$$(19) \text{ إن مجال الدالة ق (س) = } \frac{\sqrt{3\text{س}-2}}{\text{س}-2} \text{ هو}$$

$$(أ) (2, 3) \quad (ب) (-\infty, 3) \quad (ج) [2, 3] \quad (د) (2, 3)$$

$$(20) \text{ إذا كان ق (س) = س}^3 - 3\text{س}^2 \text{، د (س) = س}^2 - 5\text{س} \text{ فإن ق (د (1)) =}$$

$$(أ) 30 \quad (ب) -24 \quad (ج) -15 \quad (د) 18$$

الفصل السادس تطبيقات حياتية

الفصل السادس

تطبيقات حياتية

يشتمل هذا الفصل على عدة تطبيقات حياتية مثل تحويل الوحدات والمساحات و الحجوم والأوزان والنسب والتناسب و النسب المئوية

(٦ - ١) تحويل الوحدات

سوف نوضح من خلال الأمثلة عمليات التحويل في عدة مجالات منها :

الأوزان ، المساحة و الحجوم ، السرعة وتحويل العملات .

وبجدر الإشاره إلى أن التحويل يجب أن يحزن ضمن النظام المتري وإذا كان هناك

تحويل بين أكثر من نظام (كالتحويل مثلا من الإمبراطوري إلى المتري وبالعكس)

فإن المعلومات اللازمة سوف تعطى لذلك .

مثال إذا كان الرطل يساوى ٤٥٤ غرام فإن

$$٣٥٠ \text{ كلف} = ٣٥٠ \div ٠,٤٥٤ = ٧٧٠,٩ \text{ رطلا}$$

$$١٠٥ \text{ غ} = ١٠٥ \div ٤٥٤ = ٠,٢٣ \text{ رطلا}$$

$$١٣ \text{ رطلا} = ١٣ \times ٠,٤٥٤ = ٥,٩ \text{ كلف}$$

$$\text{مثال } ٣ \text{ م}^٣ = ٣ \times (١٠٠)^٢ = ١٠٠٠٠٠ \times ٣ = ٣٠٠٠٠٠٠ \text{ سم}^٢$$

$$٢٠٠ \text{ ليتر} = ٢٠٠ \times ١٠٠٠ \text{ سم}^٢ = ٢٠٠٠٠٠ \text{ سم}^٢$$

$$٧ \text{ م}^٢ = ٧ \times (١٠٠)^٢ = ٧ \times ١٠٠٠٠ = ٧٠٠٠٠ \text{ سم}^٢$$

$$١٥٠٠٠ \text{ سم}^٢ = ١٥٠٠٠ \div (١٠٠)^٢ = ١٥٠٠٠ \div ١٠٠٠٠ = ١٥ \text{ م}^٢$$

مثال إذا كانت سرعة سيارة تساوي ٩٠ كم/سا فإن سرعتها مقدرة بالمتر في الدقيقة هي

$$٩٠ \text{ كم/سا} = \frac{١٠٠٠ \text{ م}}{٣٦٠} \times ٩٠ = ١٥٠٠ \text{ م/د}$$

مثال

إذا كان الدولار الأمريكي يعادل ٣٠٠ فلس كويتي فكم دولارا يمكن أن نحصل عليها

إذا كان لدينا ٤٥٠ دينارا

$$\text{حل} \quad \frac{١}{٣٠٠} \$ = \text{الفلس}$$

$$٤٥٠ \text{ دك} = \frac{١}{٣٠٠} \times ١٠٠ \times ٤٥٠ = ١٥٠ \$$$

مثال

إذا كان تركيز محلول يساوي ٠,٠٤ كلف / ل فإن تركيزه مقدرا بالملغ/سم^٣ هو

$$٠,٠٤ \text{ كلف} = \frac{١٠٠٠٠٠٠ \times ٠,٠٤}{١٠٠٠ \text{ سم}^٣} = ٤٠ \text{ ملغ/سم}^٣$$

مثال

إذا كان وزن احمد يساوي ٨٥ كلف فكم رطلا يزن احمد إذا علمت أن الرطل

الواحد يعادل ٠,٤٥٤ كلف ؟

حل

$$١ \text{ كلف} = \frac{١}{٠,٤٥٤} \text{ رطلا} = ٢,٢٠ \text{ رطل}$$

$$٨٥ \text{ كلف} = ٢,٢٠ \times ٨٥ = ١٨٧ \text{ رطلا}$$

(٦ - ٢) المساحة

سوف نبين في هذا البند كيف نوجد مساحة بعض الأشكال المستوية مع العلم أن وحدة

١

المساحة هي مربع وحدة الطول .

فيما يلي بعض القوانين المستخدمة في حساب المساحة



$$\text{مساحة مثلث} = \frac{1}{2} \times \text{القاعدة} \times \text{الارتفاع}$$

$$\text{مساحة مستطيل} = \text{الطول} \times \text{العرض}$$

$$\text{مساحة مربع} = \text{طول الضلع} \times \text{طول الضلع}$$

$$\text{مساحة دائرة} = \pi (\text{نصف القطر})^2$$

مثال أوجد مساحة شبه المنحرف المبين في الشكل التالي



حل نقسم شبه المنحرف إلى مثلثين كما هو مبين في الشكل المجاور .

نلاحظ أن المثلثين لهما نفس الارتفاع ٣ سم وان قاعدتيهما

: ٤ سم ، ٥ سم


وبالتالي فإن مساحة شبه المنحرف تساوي مجموع مساحتي هذين المثلثين

$$\text{المساحة} = \frac{1}{2} \times 4 \times 3 + \frac{1}{2} \times 5 \times 3 = 6 + 7,5 = 13,5 \text{ سم}^2$$

ملاحظة : يمكن حساب المساحة باستخدام قاعدة مساحة شبه المنحرف

$$\text{مساحة شبه المنحرف} = \frac{1}{2} (\text{مجموع القاعدتين}) \times \text{الارتفاع}$$

مثال أوجد مساحة المعين في الشكل التالي



حل

نقسم المعين إلى مثلثين متطابقين قاعدة كل منهما 6 سم وارتفاعه 4 سم وبالتالي


فإن مساحة المعين تساوي ضعف مساحة أحد هذين المثلثين

$$\text{المساحة} = 2 \times \left(\frac{1}{2} \times 6 \times 4 \right) = 24 \text{ سم}^2$$

ملاحظة يمكن حساب المساحة باستخدام قاعدة مساحة المعين

المساحة تساوي نصف ناتج ضرب قطري المعين

مثال أوجد مساحة المنطقة المبينة في الشكل



حل نقسم الشكل إلى مستطيل ومربع


$$\text{المساحة} = (4 \times 6) + (2 \times 2)$$

$$= 24 + 4 = 28 \text{ سم}^2$$

مثال

أوجد مساحة المنطقة المبينة في الشكل

حل نقسم المنطقة إلى مستطيل ونصف دائرة



$$\text{المساحة} = (4 \times 6) + \left(\frac{1}{2} \times \pi \times 2^2 \right)$$

$$= (24 + 2\pi) \text{ سم}^2$$

(٣-٦) الحجم

سوف نبين في هذا البند كيف توجد حجم بعض المجسمات مع العلم أن وحدة الحجم هي مكعب وحدة الطول .

فيما يلي بعض القوانين المستخدمة في حساب الحجم

حجم شبة المكعب (متوازي المستطيلات) = الطول × العرض × الارتفاع

حجم المكعب = طول الضلع × طول الضلع × طول الضلع

حجم اسطوانة دائرية قائمة = π (نصف القطر)² × الارتفاع

حجم مخروط دائري قائم = $\frac{1}{3} \pi$ (نصف القطر)² × الارتفاع

حجم الكرة = $\frac{4}{3} \pi$ (نصف القطر)³

مثال

أوجد حجم صندوق على شكل متوازي مستطيلات طوله ٨ سم ، عرضه ٥ سم وارتفاعه ٧ سم

حل الحجم = الطول × العرض × الارتفاع

$$= 8 \times 5 \times 7 = 280 \text{ سم}^3$$

مثال ٩

يراد تعبئة ١٢٨ ليترًا من العصير في زجاجات سعة كل منها ربع ليتر. أوجد عدد الزجاجات اللازمة

حل عدد الزجاجات المطلوبة = $128 \div \frac{1}{4}$

$$= 128 \times 4 = 512 \text{ زجاجة}$$

مثال

مصنع لتعقيم وتوزيع الحليب يتم تعقيم الحليب في براميل اسطوانية قطر قاعدة كل برميل مترا واحدا وارتفاعه متران ثم يوزع الحليب بعد التعقيم في علب سعة كل علبة ٣١٤ سم^٣.
أوجد عدد العلب اللازمة لتفريغ برميل واحد مملوء بالحليب (اعتبر $\pi = ٣,١٤$)

حل

$$\text{حجم البرميل} = \pi \times \text{نق}^2 \times \text{الارتفاع}$$

$$١٥٧٠٠٠٠ = ٣,١٤ \times (٥٠)^2 \times ٢٠٠$$

$$\text{عدد العلب} = ١٥٧٠٠٠٠ \div ٣١٤ = ٥٠٠٠ \text{ علبة}$$

مثال

طريق طوله ٣ كم وعرضه ١٤ م يراد فرشته بالإسفلت بسماكة ٣٠ سم . كم شاحنة من الإسفلت يلزم لذلك إذا كانت سعة الشاحنة الواحدة ١٢ م^٣ ؟

الحل

$$\text{الحجم} = \text{الطول} \times \text{العرض} \times \text{الارتفاع}$$

$$= (٣ \times ١٠٠٠) \times ١٤ \times (٣٠ \div ١٠٠)$$

$$= ١٢٦٠٠ \text{ م}^٣$$

$$= ١٢٦٠٠ \text{ م}^٣$$

$$\text{عدد الشاحنات} = ١٢٦٠٠ \div ١٢$$

$$= ١٠٥٠ \text{ شاحنة}$$

(٦-٤) الأوزان

قبل إعطاء أمثلة حياتية عن الأوزان نذكر بعض الاختصارات المستخدمة لوحدات الأوزان

غ	للفرام	كغ	للكيلوغرام	ملغ	للمليغرام
---	--------	----	------------	-----	-----------

مثال ١

وزن أحمد وخاله معا ١٢٠ كغ. أوجد وزن كل منهما إذا كان وزن أحمد يزيد عن

وزن خاله بمقدار ٢٤ كغ

حل بما أن وزن أحمد يزيد ٢٤ كغ عن وزن خاله فإذا استيعنا هذا الفرق بين الوزنين من مجموع الوزنين فإننا سوف نحصل على ٩٦ كغ وهذا يمثل ضعف وزن خاله وبالتالي فإن

$$\text{وزن خاله} = 96 \div 2 = 48 \text{ كغ}$$

$$\text{وزن أحمد} = 48 + 24 = 72 \text{ كغ}$$

ملاحظة يمكن إيجاد الأوزان جبريا بأن نفرض أن وزن خاله س فيكون وزن أحمد

$$س + 24 = 96 \text{ وبالتالي } س + 24 = 96$$

$$\text{ومنها } س = 96 - 24 = 72 \text{ كغ وزن خاله وهكذا .}$$

مثال

الوزن الإجمالي لطاولة وكرسی وحقبة ٢٤ كغ . إذا كان وزن الكرسي ضعف

وزن الحقبة ، ووزن الطاولة ضعف وزن الكرسي، فما هو وزن الطاولة ؟

حل نفرض أن وزن الحقبة س فيكون وزن الكرسي ٢س و وزن الطاولة ٤س

$$س + 2س + 4س = 96 \text{ أو } 7س = 96 \text{ ومنها } س = 16$$

$$\text{وزن الطاولة} = 4 \times 16 = 64 \text{ كغ}$$

(٦ - ٥) معدل التغير

كثيرا ما تصادفنا حالات تتطلب منا إيجاد معدل تغير كمية بالنسبة إلى كمية أخرى

فالسرعة الوسطى مثلا هي معدل تغير موضع جسم بالنسبة للزمن وذلك عندما

ينتقل الجسم من مكان إلى آخر خلال فترة زمنية معينة ويكون

$$\text{السرعة الوسطى (معدل التغير)} = \frac{\text{المسافة المقطوعة}}{\text{الزمن اللازم لقطع المسافة}}$$

$$\text{أو المسافة} = \text{المعدل} \times \text{الزمن}$$

مثال سيارة سرعتها ٧٠ كم/سا . أوجد المسافة التي تقطعها السيارة خلال ٤ ساعات

$$\text{حل المسافة} = \text{السرعة} \times \text{الزمن}$$

$$= 70 \times 4 = 280 \text{ كم}$$

مثال قطعت سيارة مسافة ٤٠٠ ميلا على مرحلتين حيث كانت سرعتها ٤٠ ميلا

في الساعة خلال نصف المسافة الأولى وكانت سرعتها ٥٠ ميلا في الساعة خلال

النصف الآخر . أوجد السرعة الوسطى للسيارة خلال الرحلة

حل نوجد أولا الزمن الذي استغرقته السيارة لقطع المسافة الكلية .

$$\text{الزمن اللازم لقطع المرحلة الأولى} = \frac{\text{المسافة}}{\text{السرعة}} = \frac{200}{40} = 5 \text{ ساعات}$$

$$\text{الزمن اللازم لقطع المرحلة الثانية} = \frac{\text{المسافة}}{\text{السرعة}} = \frac{200}{50} = 4 \text{ ساعات}$$

$$\text{الزمن الكلي} = 4 + 5 = 9 \text{ ساعات}$$

$$\text{السرعة الوسطى} = \frac{\text{المسافة الكلية}}{\text{الزمن الكلي}} = \frac{400}{9} = 44.4 \text{ ميل / سا}$$

لاحظ أن السرعة الوسطى لا تساوي متوسط السرعتين

(٦ - ٦) النسبة والتناسب

النسبة هي المقارنة بين كميتين أو أكثر. فمثلا عندما تكون نسبة دخلي الشهري

إلى دخل أخي هي ٣ : ٢ فإن هذا يعني أنه كلما حصل أخي على دينارين فإنني

أحصل على ثلاثة دنانير وإذا ربح أخي ٢٠٠ ديناراً فإنني أربح ٣٠٠ ديناراً وهكذا

قاعدة إذا ضربنا طرفي النسبة بعدد ما فإن النسبة لا تتغير فالنسب ٤ : ٦ ، ١٥ : ١٠ ،

٢٨ : ٤٢ جميعها تساوي النسبة ٢ : ٣

وبذلك يمكن معاملة النسبة ٢ : ٣ معاملة الكسر $\frac{٣}{٢}$

مثال

إذا كانت نسبة فوز أحد النوادي الرياضية إلى خسارته ١٥ : ١٦ وكان عدد مرات

خسارته ٦٤ مرة فما هو عدد مرات فوزه ؟

حل ليكن ف عدد مرات الفوز ، خ عدد مرات الخسارة

لدينا $\frac{ف}{خ} = \frac{١٥}{١٦}$ ومنها ١٦ ف = ١٥ خ

عندما خ = ٦٤ فإن ١٦ ف = ١٥ × ٦٤ أو ف = ٦٠ مرة

مثال نسبة ما يملك علي وسامي وبدر هي ٣ : ٢ : ٥

أوجد المبلغ الإجمالي الذي يملكه الثلاثة معا إذا كان ما يملك سامي ١٤ دك

حل مجموع الحصص = ٣ + ٢ + ٥ = ١٠ حصة

بما أن سامي يملك ١٤ دينار وهذا يقابل حصتين

فإن الحصة الواحدة ٧ دك وبالتالي المبلغ الإجمالي = ٧ × ١٠ = ٧٠ دك

التناسب العردي

إذا كان هناك كميتان متغيرتان بحيث تبقى النسب بينهما ثابتة فإننا نقول عن الكميتين

أنهما متنسبتان طرئياً أو إن بينهما تناسباً

فمثلاً ، إذا اشترينا عدداً من الأقلام المشابهة ، فإن هناك تناسباً بين ثمن

الأقلام وعددها لأن

$$\frac{\text{ثمن الأقلام}}{\text{عدد الأقلام}} = \text{ثابت وهو ثمن القلم الواحد}$$

مثال

إذا كان ثمن ١١ قلم يساوي ٣٣ ذلك فما هو ثمن ١٥ قلماً ؟

$$\text{حل} \quad \text{ثمن القلم الواحد} = ٣٣ \div ١١ = ٣ \text{ ذلك}$$

$$\text{ثمن ١٥ قلماً} = ٣ \times ١٥ = ٤٥ \text{ ذلك}$$

التناسب العكسي

إذا كان هناك تناسب بين كمية ومقروب كمية أخرى فإننا نقول عن الكميتين أنهما

متنسبتان عكسياً . فمثلاً نجد أن هناك تناسباً عكسياً بين عدد العمال والزمن اللازم

كي ينجزوا عملاً ما فكلما زاد عدد العمال كلما قل الوقت اللازم لإنجاز العمل

مثال

يحتاج أربعة عمال إلى عشرة أيام لطلاء جدران منزل ما فكم يوماً يحتاج خمسة

عمال لإنجاز هذا العمل ؟

حل

$$\text{لإنجاز العمل يحتاج العامل الواحد إلى } ٤ \times ١٠ = ٤٠ \text{ يوماً}$$

$$\text{لإنجاز العمل يحتاج خمسة عمال إلى } ٤٠ \div ٥ = ٨ \text{ أيام}$$

(٦-٧) النسب المئوية

عندما نريد أن نعبر عن جزء من مئة نستخدم الرمز % الذي يعبر عن النسبة المئوية

فمثلا عندما نكتب ١٣% فإننا نقصد بذلك ١٣ من مائة ويمكن التعبير عن النسبة

المئوية على صورة كسر أو على صورة عدد عشري فمثلا

$$١٣\% = \frac{١٣}{١٠٠} = ٠,١٣$$

إذا أردنا استخراج ٢٠% من ٩٠ مثلا فإننا نكتب

$$١٨ = \frac{٢٠}{١٠٠} \times ٩٠ = ٠,٢٠ \times ٩٠$$

مثال

فصل دراسي فيه ٢٥ تلميذ . إذا كان ٧٢% من التلاميذ يجيدون اللغة العربية فما هو

عدد التلاميذ الذين لا يجيدون هذه اللغة ؟

حل

$$\text{عدد الذين يجيدون اللغة} = \frac{٧٢}{١٠٠} \times ٢٥ = ١٨ \text{ تلميذ}$$

$$\text{عدد الذين لا يجيدون اللغة} = ٢٥ - ١٨ = ٧ \text{ تلاميذ}$$

يمكن الحصول على هذه النتيجة إذا لاحظنا أن النسبة المئوية للتلاميذ

$$\text{الذين لا يجيدون اللغة هي } ٢٨\% \text{ وبالتالي فإن عددهم} = \frac{٢٨}{١٠٠} \times ٢٥ = ٧$$

مثال

وزن إبراهيم اليوم هو ٨% أكثر مما كان عليه السنة الماضية .

أوجد وزنه اليوم إذا كان وزنه السنة الماضية ٥٥ كغ

حل

$$\text{مقدار الزيادة في الوزن} = \frac{٨}{١٠٠} \times ٥٥ = ٤,٤ \text{ كغ}$$

$$\text{وزنه اليوم} = ٥٥ + ٤,٤ = ٥٩,٤ \text{ كغ}$$

ملاحظة عندما تتغير كمية ما (كان تزداد أو تنقص) فإن

$$\frac{\text{النسبة المئوية للتغير}}{\text{النسبة المئوية للتغير}} = \frac{\text{التغيير الفعلي}}{\text{الكمية الأصلية}} \times 100\%$$

مثال

ارتفع سعر سيارة من ٤٠٠٠ دك إلى ٥٠٠٠ دك . أوجد النسبة المئوية للزيادة

حل

$$\frac{\text{النسبة المئوية للزيادة}}{\text{النسبة المئوية للزيادة}} = \frac{\text{التغيير الفعلي}}{\text{الكمية الأصلية}} \times 100\%$$

$$25\% = 100\% \times \frac{5000 - 4000}{4000} =$$

مثال

في أحد التنزيلات انخفض سعر إحدى السلع من ٦٠ دك إلى ٤٨ دك .
أوجد النسبة المئوية للتخفيض.

حل

$$\frac{\text{النسبة المئوية للتخفيض}}{\text{النسبة المئوية للتخفيض}} = \frac{\text{التغيير الفعلي}}{\text{الكمية الأصلية}} \times 100\%$$

$$20\% = 100\% \times \frac{60 - 48}{60} =$$

مثال

في أحد التنزيلات كانت النسبة المئوية لتخفيض الأسعار ٣٥ %
إذا كان سعر قميص في التنزيلات ١٣ دك فما هو سعره قبل التنزيلات ؟

حل

$$\text{السعر بعد التنزيلات} = \text{السعر الأصلي} \times 0,65$$

$$13 = \text{السعر الأصلي} \times 0,65$$

$$\text{السعر الأصلي} = 13 \div 0,65 = 20 \text{ دك}$$

مسائل مختارة لاختبار القدرات عن الفصل السادس

(١) في أحد التنزيلات جرى تخفيض الأسعار على كافة السلع بنسبة ٣٠٪

إذا كان سعر تلفزيون في التنزيلات ٢١٠ دك فإن سعره الأصلي هو

(أ) ٢٧٠ دك (ب) ٢٨٠ دك (ج) ٣٠٠ دك (د) ٧٠٠ دك

(٢) وزن بسام اليوم ٧٢ كلغ . إذا كان وزنه السنة الماضية ٦٤ كلغ

فإن النسبة المئوية للزيادة في وزنه هي

(أ) ١٢,٥٪ (ب) ١٠,٥٪ (ج) ٩٪ (د) ٨٪

(٣) إذا انخفض سعر هاتف نقال من ١٦٠ دك إلى ١٢٨ دك فإن النسبة المئوية للتخفيض هي

(أ) ٢٠٪ (ب) ٢٥٪ (ج) ٣٠٪ (د) ٨٠٪

(٤) إذا كانت سرعة سيارة ٤٥ كم/سا فإن سرعتها مقدرة بالكيلومتر/دقيقة هي

(أ) ٠,٥ (ب) ١,٣٣ (ج) ٢,٧ (د) ٠,٧٥

(٥) إذا كان سرعة سيارة ١٥ م/ثا فإن سرعتها مقدرة بالكيلومتر/ساعة هي

(أ) ٥٥ (ب) ٦٠ (ج) ٥٤ (د) ١٥٠

(٦) إذا قطعت سيارة مسافة ٢٤٠ كم خلال ساعتين فإن سرعة السيارة مقدرة بالمتري/دقيقة هي

(أ) ٤٠٠٠ (ب) ٢٠٠٠ (ج) ٧٢٠٠ (د) ٢٠٠

(٧) مستطيل طوله يساوي ضعف عرضه . إذا كانت مساحة المستطيل ٥٠ سم^٢

فإن محيطه يساوي

(أ) ١٥ سم (ب) ٣٠ سم (ج) ٤٠ سم (د) ٦٠ سم

(٨) يزيد طول مستطيل م^٢ عن عرضه . إذا كانت مساحة المستطيل م^٢ ٤ فإن طول المستطيل يساوي

١ (أ) ١٢ م (ب) ٨ م (ج) ٤ م (د) ٦ م

(٩) في مثلث قائم الزاوية إذا كان طول أحد الضلعين القائمين ضعف طول الضلع القائم الآخر وإذا كانت مساحة المثلث ٤سم^٢ فإن طول الوتر يساوي

(أ) $\sqrt{10}$ سم (ب) $\sqrt{20}$ سم (ج) $\sqrt{5}$ سم (د) ٥ سم

(١٠) مصنع عصير يحفظ العصير في خزانات سعة كل منها ٥ م^٣ . يتم توزيع العصير بعد ذلك في حلب سعة كل علبة ٣٠٠سم^٣ . إذا كان سعر العلبة

الواحدة ١٠٠ فلس فإن سعر العصير في الخزان الواحد هو

(أ) ٢٥٠ دك (ب) ٥٠٠ دك (ج) ٧٥٠ دك (د) ١٠٠٠ دك

(١١) حوض سباحة طوله ٢٧ م ، عرضه ٥ م وعمقه ٢ م . نريد ملء الحوض بالماء وذلك باستخدام سيارات نقل مياه . إذا كانت سعة خزان كل سيارة ٩ م^٣ من الماء فإن عدد السيارات اللازمة لملء الحوض

(أ) ١٠ (ب) ٢٠ (ج) ٣٠ (د) ٤٠

(١٢) كمية من الماء تكفي ستة مسافرين لمدة عشرة أيام . إذا استخدم الماء خمسة فقط من المسافرين وبنفس المعدل فإنها تكفيهم

(أ) ٦ أيام (ب) ٣ أيام (ج) ٥ أيام (د) ١٢ يوما

الفصل السابع
استراتيجيات الحل والنمذجة

96618707

الفصل السابع

استراتيجيات الحل والنمذجة

١

في هذا الفصل سوف نعطي أمثلة متنوعة لا يحتاج حلها إلى رياضيات متقدمة أو متخصصة حيث يتطلب الأمر إجراء عمليات حسابية بسيطة.

مثال

خزان مياه فارغ تستطيع حنفية في أعلاه أن تملأه خلال ساعتين وأخرى في أسفله تحتاج ثلاث ساعات لإفراغه فكم من الوقت يستغرق ملء الخزان إذا فتحنا الحنفيتين معا ؟

حل خلال ساعة واحدة تملأ الحنفية الأولى $\frac{1}{2}$ الخزان وتفرغ الحنفية الثانية $\frac{1}{3}$ الخزان

صافي الباقي في الخزان خلال ساعة واحدة :

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \text{ الخزان}$$

إذا امتلأ $\frac{1}{6}$ الخزان خلال ساعة واحدة فإن ملء الخزان يحتاج إلى ٦ ساعات

مثال يحتاج علي وخالد إلى ٤ ساعات لإتجاز عمل ما . إذا كان باستطاعة علي أن ينجز

العمل لوحده خلال ٦ ساعات فكم ساعة يحتاج خالد لإتجاز العمل لوحده

حل إذا فرضنا أن خالد يحتاج س ساعة كي ينجز العمل لوحده

خلال ساعة واحدة ينجز خالد $\frac{1}{س}$ من العمل وينجز علي $\frac{1}{٦}$ العمل وينجزان معا $\frac{1}{٤}$

العمل وبالتالي فإن

$$\frac{1}{٤} = \frac{1}{٦} + \frac{1}{س} \quad \text{أو} \quad \frac{1}{١٢} = \frac{1}{٦} - \frac{1}{٤} = \frac{1}{س} \quad \text{وبالتالي س} = ١٢ \text{ ساعة}$$

مثال

مدينتان أ، ب تبعدان عن بعضهما ٢٧٥ كم. غادرت سيارة المدينة أ متوجهة نحو المدينة ب بسرعة ٥٠ كم /سا وفي الوقت نفسه غادرت سيارة أخرى المدينة ب باتجاه المدينة أ بسرعة ٦٠ كم /سا. أوجد بعد كم ساعة سوف تلتقي السيارتان

حل

عندما تلتقي السيارتان فإن المسافة التي تقطعنها هي ٢٧٥ كم

ولكن المسافة التي تقطعها السيارتان خلال ساعة واحدة

$$\text{هي } ٦٠ + ٥٠ = ١١٠ \text{ كم}$$

وبالتالي فإن الزمن اللازم لقطع المسافة الكلية هو

$$٢٧٥ \div ١١٠ = ٢ \frac{١}{٢} \text{ ساعة}$$

مثال

محيط مربع يساوي ضعف محيط مثلث متطابق الأضلاع إذا كان طول أحد أضلاع

المربع ٧٥ سم فما هو طول أحد أضلاع المثلث ؟

حل

$$\text{محيط المربع} = ٤ \times ٧٥ = ٣٠٠ \text{ سم}$$

ولكن محيط المربع = ٢ × محيط المثلث

$$\text{أو محيط المثلث} = \frac{١}{٢} \times \text{محيط المربع}$$

$$= \frac{١}{٢} \times ٣٠٠ = ١٥٠ \text{ سم}$$

$$\text{طول ضلع المثلث} = ١٥٠ \div ٢ = ٧٥ \text{ سم}$$

مثال

مثلث يزيد طول أحد أضلاعه ٥ سم على ضعف طول ضلعه الأقصر وطول ضلعه الثالث يساوي ثلاثة أضعاف طول الضلع الأقصر^١ . إذا كان محيط المثلث ٧١ سم فأوجد طول الضلع الأقصر للمثلث

حل ليكن س طول الضلع الأقصر فيكون طول الضلعين الآخرين

$$٢س + ٥ + ٣س$$

وبما أن محيط المثلث يساوي ٧١ سم فإن

$$٧١ = ٣س + ٥ + ٢س$$

$$٧١ = ٥ + ٢س + ٣س \quad \text{أي أن } ٦٦ = ٥س \quad \text{أو } ١١ = س$$

مثال

لدى سالم س ديناراً ولدى أحمد ثلاثة دنانير أقل من سالم ولدى يوسف ضعف ما لدى أحمد فكم ديناراً لدى يوسف ؟

حل

لدى سالم س ديناراً ، لدى أحمد (س - ٣) ديناراً وبالتالي فإن

لدى يوسف ٢ (س - ٣) ديناراً

مثال

يبلغ محمد من العمر س سنة . إذا كان خالد قد ولد قبل ص سنة من ولادة

محمد وإذا كان سامي أصغر من خالد ع سنة . فما هو عمر سامي ؟

$$\text{حل} \quad \text{عمر خالد} = س + ص$$

$$\text{عمر سامي} = س + ص - ع$$

مثال أوجد طول قطر دائرة بدلالة مساحتها

حل نفرض أن طول قطر الدائرة l ومساحتها h
مساحة الدائرة $= \pi r^2$ حيث $r = \frac{l}{2}$ طول نصف قطر الدائرة

$$\frac{l^2 \pi}{4} = \left(\frac{l}{2}\right)^2 \pi = h$$

$$\frac{h^2}{\pi} = l^2 \quad \text{ومنها} \quad h = l \pi$$

$$\frac{h}{\pi} \sqrt{2} = \frac{h^2}{\pi} \sqrt{2} = l$$

مثال صندوق طوله s وعرضه $\frac{3}{4}$ طوله. إذا كان ارتفاع الصندوق يزيد 3 عن ضعف عرضه فما هو حجم الصندوق؟

حل طول الصندوق، s ، عرضه $\frac{3}{4}$ ،

$$\text{ارتفاع الصندوق} = 2 \times \frac{3}{4} s + 3 = \frac{3}{2} s + 3$$

$$\text{حجم الصندوق} = s \left(\frac{3}{4} s\right) \left(\frac{3}{2} s + 3\right)$$

$$= \frac{9}{8} s^2 (s + 2)$$

مثال إذا كان $s = \frac{b-a}{1-h}$ فاوجد h

$$\text{حل} \quad s = \frac{b-a}{1-h}$$

$$s(1-h) = b-a$$

$$s-hs = b-a$$

$$hs = s - (b-a)$$

$$h = \frac{s - (b-a)}{s}$$

$$h = \frac{s-a}{s-b}$$

مسائل مختارة لاختبار القدرات عن الفصل السابع

(١) عمر فهد الآن يقل عشر سنوات عن عمر طارق وبعد خمس سنوات يصبح عمر طارق

ضعف عمر فهد فكم سيكون عمر فهد بعد ثلاث سنوات ؟

(أ) ٦ سنوات (ب) ٨ سنوات (ج) ١١ سنة (د) ١٤ سنة

(٢) إذا كان محيط دائرة يساوي ل فإن مساحتها تساوي

(أ) $\pi^2 ل$ (ب) $\frac{\pi^2}{ل}$ (ج) $\frac{ل}{\pi^2}$ (د) $\pi^2 ل^2$

(٣) يستطيع علي أن ينسخ ٥٠ صفحة من كتاب خلال ٨ ساعات وتستطيع نورا القيام بذلك

خلال ٦ ساعات . كم ساعة يلزم علي ونورا معا ليقوما بنسخ ١٠٠ صفحة من الكتاب ؟

(أ) $\frac{6}{7}$ ساعة (ب) ٧ ساعات (ج) ٩ ساعات (د) $\frac{5}{7}$ ساعة

(٤) مستطيل طوله س وعرضه ص . إذا ازداد كل من طوله وعرضه بمقدار هـ فإن

المساحة تزداد بمقدار

(أ) س ص هـ (ب) س هـ + ص هـ (ج) س هـ + ص هـ + هـ هـ (د) س ص + هـ هـ

(٥) مستطيل طوله ٣ س + ٢ ص . إذا كان محيط المستطيل ١٠ س + ٦ ص

فإن عرضه يساوي

(أ) س + ٢ ص (ب) ٢ س + ص (ج) ٤ س + ٢ ص (د) ٧ س + ٤ ص

(٦) إذا كان $ل = \frac{م^3 - هـ - ٤}{هـ + ٢ م}$ فإن هـ =

(أ) $\frac{ل + ٤}{ل^2 - م^3}$ (ب) $\frac{ل^2 - م^3}{ل + ٤}$ (ج) $\frac{ل^2 + م^3}{ل - ٤}$ (د) $\frac{ل - ٤}{ل^2 + م^3}$

1

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{27 \text{ ص س}^0}{8 \text{ س}^1 \text{ ص}^3} \right) \quad (1)$$

$$(أ) \frac{2 \text{ س}^2}{3 \text{ ص}} \quad (ب) \frac{2 \text{ س}^2}{3 \text{ ص}} \quad (ج) \frac{3 \text{ ص}}{2 \text{ س}} \quad (د) \frac{3 \text{ ص}}{2 \text{ س}}$$

$$(2) \text{ إذا كان د (س) = س + } \frac{3}{\text{س}}, \text{ هـ (س) = } \frac{1}{3 + \text{س}}$$

$$\text{فإن (هـ د) (س) =}$$

$$(أ) \frac{1}{\text{س}} \quad (ب) \frac{\text{س}}{\text{س}^2 + 3} \quad (ج) \frac{\text{س}}{\text{س} + 6} \quad (د) \frac{\text{س}}{\text{س}^2 + 3 + 3}$$

(3) إذا كان ناتج جمع أربعة أعداد صحيحة متتالية يساوي ص فإن أصغر هذه الأعداد معبرا عنه بدلالة ص هو

$$(أ) \frac{4 - \text{ص}}{6} \quad (ب) \frac{4 + \text{ص}}{6} \quad (ج) \frac{6 - \text{ص}}{4} \quad (د) \frac{6 + \text{ص}}{4}$$

$$(4) \text{ إن مجموعة الحل للمعادلة } \frac{16}{\text{س}^2 - 2} = \frac{\text{س}}{2 - \text{س}} - \frac{\text{س}^2}{2 + \text{س}} \text{ هي}$$

$$(أ) \{ 8 \} \quad (ب) \{ 8 - \} \quad (ج) \{ 2, 8 - \} \quad (د) \{ 8, 2 - \}$$

$$(5) \text{ إن مجموعة الحل للمتباينة } \frac{1}{|1 - \text{س}|} < 0.5 \text{ هي}$$

$$(أ) (3, 1 -) \quad (ب) (1 - , \infty) \quad (ج) (1, 1 -) \cup (3, 1) \quad (د) (\infty, 3)$$

$$(6) \text{ إذا كان أ س + ب = جـ (س - أ) فإن س =}$$

$$(أ) \frac{أ + ب}{ج - أ} \quad (ب) \frac{أ - ب}{ج - أ} \quad (ج) \frac{ب - أ}{ج - أ} \quad (د) \frac{أ - ب}{ج - أ}$$

(٧) قاد علي سيارته بسرعة ٥٠ كم / ساعة لمدة ساعتين ثم زاد سرعته بنسبة ٥٠٪

واستمر على هذه السرعة لمدة ثلاث ساعات . أوجد متوسط سرعته مقدرة

بالكيلومتر في الساعة وذلك خلال الساعات الخمس ١

(أ) ٥٥ (ب) ٦٠ (ج) ٦٥ (د) ٧٠

(٨) إذا كان $ق (س) = \frac{س - ١}{س + ١}$ فإن $ق (ص - ١) =$

(أ) $\frac{ص + ٢}{ص}$ (ب) $\frac{ص - ٢}{ص}$ (ج) $\frac{ص}{ص - ٢}$ (د) $\frac{ص}{ص + ٢}$

(٩) إن مجال الدالة $د (س) = \sqrt{\frac{٢(١ + س)}{١ - س}}$ هو

(أ) $(١ - \infty, ١)$ (ب) $\{١\} - ح$ (ج) $(١ - \infty, ١]$ (د) $(١, \infty)$

(١٠) أ، ب، ج ثلاثة أعداد صحيحة متتالية بحيث يكون $ا > ب > ج$

إن العبارة الصحيحة فيما يلي هي

(I) $ج - ب = ١$ (II) $\frac{ا ب ج}{٣}$ عدد صحيح (III) $ا + ب + ج$ عدد زوجي

(أ) (I) فقط (ب) (II) فقط (ج) (I) و (II) فقط (د) (II) و (III) فقط

(١١) خزان مكعب الشكل طول ضلعه ل وحجمه يساوي حجم برميل اسطوانى .

إذا كان طول نصف قطر قاعدة البرميل يساوي ارتفاعه ع فإن $ل =$

(أ) $\sqrt[٢]{\pi ع}$ (ب) $\frac{\pi}{ع}$ (ج) $\frac{ع}{\pi \sqrt[٢]{}}$ (د) $\frac{\pi}{ع}$

(١٢) إذا كان ناتج ضرب عددين صحيحين أكبر من ١٠٢ وأصغر من ١٠٥ فإن أحد هذين العددين لا يمكن أن يكون

- (أ) ٥ (ب) ١٠ (ج) ١٥ (د) ٢٠

$$(١٣) = \frac{4}{3-s^2-s^3} - \frac{s}{1+s}$$

(أ) $\frac{s-4}{s^2-s-2}$ (ب) $\frac{s-4}{s^2-s-3}$ (ج) $\frac{s-4}{s^2-s-2}$ (د) $\frac{s-4}{s+1}$

(١٤) إذا كان $s > 1$ فإن $\frac{s-1}{s+1} = \frac{s^2-1}{s^2+2s+1}$

(أ) $\frac{s-1}{s}$ (ب) $\frac{s-1}{s}$ (ج) $\frac{s+1}{s}$ (د) $\frac{s+1}{s}$

(١٥) إذا كانت الكسور $\frac{4}{n}$ ، $\frac{5}{n}$ ، $\frac{7}{n}$ في أبسط صورة

فإن القيمة الممكنة للعدد n هي

- (أ) ٣٤ (ب) ٢٥ (ج) ٢٦ (د) ٢٧

(١٦) إن مجموعة الحل للمتباينة $\frac{5-s}{2-s} + 3 \leq \frac{3-s}{2-s}$ هي

- (أ) $[-\infty, 7]$ (ب) $[-\infty, 7]$ (ج) $[-\infty, 7]$ (د) $[-\infty, 7]$

(١٧) مثلث قائم الزاوية محيطه ٣٦ إذا كانت أطوال أضلاع المثلث هي

s ، $s+3$ ، $s+6$ فإن مساحة المثلث تساوي

- (أ) ٢٧ (ب) ٥٤ (ج) ٨١ (د) ١٠٨

١٨) السعر النهائي لسلعة هو \$ ٣٠٦ وذلك بعد إجراء تخفيض ١٥٪ ثم

تخفيض آخر ١٠٪ على السعر الأصلي . ما هو السعر الأصلي للسلعة ؟

(أ) \$ ٢٣٤,٠٩ (ب) \$ ٤٠٠ (ج) \$ ٣٨٢,٥ (د) \$ ٤٠٨

١٩) يراد توزيع الأرباح وقدرها \$ ٢٤٠٠٠ على ثلاثة شركاء بنسبة ٥ : ٤ : ٣

ما هي قيمة الحصة الأدنى ؟

(أ) \$ ١٢٠٠ (ب) \$ ٣٠٠٠ (ج) \$ ٦٠٠٠ (د) \$ ٨٠٠٠

٢٠) ل ، م عددان سالبان . إذا كان ل أصغر من - ١ وكان م أكبر من - ١

فإن القيم الممكنة لنتائج الضرب ل × م هي

(أ) جميع الأعداد السالبة الأصغر من - ١

(ب) جميع الأعداد السالبة الأكبر من - ١

(ج) جميع الأعداد الموجبة

(د) جميع الأعداد الموجبة الأصغر من ١

أجوبة المسائل المختارة لاختبار القدرات

الفصل الأول

ج (١)	ج (٢)	أ (٣)	ب (٤)	أ (٥)
ب (٦)	ب (٧)	د (٨)	ج (٩)	د (١٠)
ب (١١)	د (١٢)	أ (١٣)	د (١٤)	ب (١٥)
أ (١٦)	د (١٧)	ب (١٨)	أ (١٩)	د (٢٠)
أ (٢١)	ب (٢٢)	د (٢٣)	ب (٢٤)	ب (٢٥)

الفصل الثاني

ج (١)	ب (٢)	ب (٣)	د (٤)	ج (٥)
ج (٦)	د (٧)	أ (٨)	ب (٩)	أ (١٠)
ج (١١)	ج (١٢)	ج (١٣)	د (١٤)	د (١٥)
ج (١٦)	د (١٧)	ج (١٨)	د (١٩)	ج (٢٠)
ج (٢١)	أ (٢٢)	د (٢٣)	أ (٢٤)	ج (٢٥)

الفصل الثالث

د (١)	ج (٢)	د (٣)	ب (٤)	ج (٥)
د (٦)	أ (٧)	ب (٨)	د (٩)	ب (١٠)
د (١١)	ج (١٢)	ب (١٣)	أ (١٤)	

الفصل الرابع

أ (١)	ب (٢)	أ (٣)	ب (٤)	أ (٥)
د (٦)	أ (٧)	ج (٨)	أ (٩)	د (١٠)
ج (١١)	أ (١٢)	ج (١٣)	ج (١٤)	د (١٥)
أ (١٦)				

الفصل الخامس

(١) أ	(٢) ب	(٣) ج	(٤) ب	(٥) د
(٦) أ	(٧) د	(٨) ج	(٩) ب	(١٠) ب
(١١) أ	(١٢) ب	(١٣) أ	(١٤) ج	(١٥) د
(١٦) ب	(١٧) د	(١٨) ب	(١٩) د	(٢٠) ب

الفصل السادس

(١) ج	(٢) أ	(٣) أ	(٤) د	(٥) ج
(٦) ب	(٧) ب	(٨) د	(٩) ب	(١٠) ب
(١١) ج	(١٢) د			

الفصل السابع

(١) ب	(٢) ج	(٣) أ	(٤) ج	(٥) ب
(٦) أ				

نموذج اختبار القدرات

(١) أ	(٢) د	(٣) ج	(٤) أ	(٥) ج
(٦) أ	(٧) ج	(٨) ب	(٩) د	(١٠) ج
(١١) أ	(١٢) د	(١٣) ب	(١٤) أ	(١٥) د
(١٦) د	(١٧) ب	(١٨) ب	(١٩) ج	(٢٠) ج

Kuwait University - Faculty of Science
Consultation & Training Office (CTO)
P.O.Box 5969, 13060, Safat, Kuwait
Tel.: 24985630 / 24987662 / 24987254

Fax: (965) 24843891

E-mail: sc_cto@kuc01.kuniv.edu.kw - Website: www.sc-cto.kuniv.edu.kw

جامعة الكويت - كلية العلوم
مكتب الاستشارات والتدريب
ص.ب ٥٩٦٩ الصفاة : ١٣٠٦٠ - الكويت
ت: ٢٤٩٨٥٦٣٠ / ٢٤٩٨٧٦٦٢ / ٢٤٩٨٧٢٥٤
أ / عبد الرحمن : ٩٦٥) ٩٦٦١٨٧٠٧